

## ETIQUETA-PROSPECTO

### **DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO - ETIQUETA-PROSPECTO** **ENVASE 250 ml**

#### **1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

AEROFAR 20 mg/g suspensión para pulverización cutánea.

#### **2. COMPOSICIÓN**

Cada g contiene:

**Principios activos:**

Hidrocloruro de clortetraciclina                      20 mg  
(equivalente a 18,59 mg de clortetraciclina)

**Excipientes:**

Azul patente V (E-131)

Suspensión de color azul verdoso.

#### **3. TAMAÑO DEL ENVASE**

Contenido neto: 250 ml (180 g).

#### **4. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, ovino, caprino, porcino, équidos, aves, perros y gatos.

#### **5. INDICACIONES DE USO**

**Indicaciones de uso**

Heridas quirúrgicas, heridas superficiales, coadyuvante en el tratamiento del pederio y otras infecciones podales causadas por microorganismos sensibles.

#### **6. CONTRAINDICACIONES**

**Contraindicaciones**

No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.

## 7. ADVERTENCIAS ESPECIALES

### Advertencias especiales

#### Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Agitar antes de usar. Antes de la aplicación limpiar la zona afectada, eliminando la suciedad y los tejidos necrosados. No aplicar sobre los ojos, ya que puede aparecer una irritación local. Evitar el contacto o lamido de la zona afectada durante 5 minutos.

#### Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Este medicamento veterinario contiene propelentes inflamables.

Recipiente a presión. Extremadamente inflamable. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 45 °C. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición. No pulverizar sobre una llama u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar incluso después del uso.

La clortetraciclina puede producir reacciones de hipersensibilidad (alergia) y dermatitis de contacto. Las personas con hipersensibilidad conocida a las tetraciclinas deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Este medicamento veterinario puede causar irritación ocular.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y las mucosas durante la administración del medicamento veterinario. Usar un equipo de protección individual consistente en guantes impermeables al manipular el medicamento veterinario. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con abundante agua.

Evitar la inhalación del medicamento veterinario. Efectuar el tratamiento en zonas bien ventiladas o al aire libre.

Si aparecen síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. La inflamación de la cara, labios u ojos o la dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente.

Lavar las manos después de usar el medicamento veterinario.

No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

#### Otras precauciones:

Se debe eliminar la parte teñida de la piel del animal antes de poder usar el resto del animal para consumo humano.

#### Gestación y lactancia:

No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos.

#### Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se han descrito.

#### Sobredosificación:

El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación.

#### Restricciones y condiciones especiales de uso:

Medicamento administrado bajo el control o supervisión del veterinario

En tratamientos continuados, pueden aparecer dermatopatías por hipersensibilidad, que desaparecen paulatinamente al suspender la medicación.

## 8. ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

## Acontecimientos adversos

Bovino, ovino, caprino, porcino, équidos, aves, perros y gatos.

Muy raros
(<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):
Reacciones cutáneas locales.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en esta etiqueta-prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de esta etiqueta-prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación: Tarjeta verde [http://bit.ly/tarjeta\\_verde](http://bit.ly/tarjeta_verde) o NOTIFICAVET <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

## 9. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

### Posología para cada especie, modo y vías de administración

Uso cutáneo.

Agitar el envase pulverizador antes de usarlo; pulverizar la zona afectada con el brazo extendido hasta cubrir ésta. Repetir el tratamiento según evolución y gravedad de las lesiones.

## 10. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

### Instrucciones para una correcta administración

## 11. TIEMPOS DE ESPERA

### Tiempos de espera

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

Su uso no está autorizado en las ubres de animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

## 12. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

### Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Proteger de la luz.

Conservar en lugar seco.

## 13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN

### Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente. Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

#### **14. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS**

##### **Clasificación de los medicamentos veterinarios**

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

#### **15. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FORMATOS**

1077 ESP

##### **Formato**

Envase a presión conteniendo 250 ml (180 g).

#### **16. FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DE LA ETIQUETA-PROSPECTO**

##### **Fecha de la última revisión de la etiqueta-prospecto**

04/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la Base de Datos de Medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

#### **17. DATOS DE CONTACTO**

##### **Datos de contacto**


Titular de la autorización de comercialización, fabricante responsable de la liberación del lote y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

DIVASA-FARMAVIC, S.A.  
Ctra. Sant Hipòlit, km. 71  
08503 Gurb-Vic (Barcelona)  
Spain  
Tel: 938860100  
Email: [pharmacovigilance@divasa-farmavic.com](mailto:pharmacovigilance@divasa-farmavic.com)

#### **18. INFORMACIÓN ADICIONAL**

##### **Información adicional**

Símbolo de una llama y la frase “EXTREMADAMENTE INFLAMABLE (F<sup>+</sup>)”



**19. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**20. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp {mm/yyyy}

**21. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}