ETIQUETA-PROSPECTO

TEXTO DE LA ETIQUETA-PROSPECTO (Bidón de 1 Kg / Saco de 5 Kg / Saco de 10 Kg /Saco de 20 Kg / Saco de 25 Kg / Saco de 50 Kg)

STABOX 50 mg/g PREMIX PARA CERDOS
Premezcla medicamentosa
Uso veterinario
1 Kg/5 Kg /10 Kg /20 Kg /25 Kg/ 50 Kg

Composición:

Amoxicilina (trihidrato)	50	mg
Excipientes csp	1	g

Vía de administración:
Vía oral, mezclada con el pienso

Indicaciones /Especies de destino
Lechones: Control de infestaciones estreptocócicas en lechones después del destete.
Reducción de la mortalidad y morbilidad debidas a *Streptococcus suis*

Posología y modo de administración
La premezcla medicamentosa se administra directamente mezclada con el pienso, a las siguientes dosis 400 ppm en pre-starter (8 Kg/TM) y 300 ppm en starter (6 Kg/Tm),
Esta posología equivale a 15 mg/de amoxicilina /Kg p.v/día. La duración del tratamiento será de dos semanas.
La concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de pienso.

Contraindicaciones
No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. No administrar por vía oral a conejos, cobayas y hámsters, ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre población bacteriana cecal.
No administrar a équidos ya que la amoxicilina, al igual que todas las aminopenicilinas, tiene una acción importante sobre población bacteriana cecal.
Por vía oral, no administrar a animales con el rumen funcional.

Efectos secundarios
Reacciones de sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico.
Suprainfecciones por gérmenes no sensible tras su uso prolongado.
Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis.

Precauciones especiales de uso
Ajustar la dosis en animales con alteraciones renales.

Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad a la bacteria causante del proceso.

Interacciones
No usar simultáneamente con la neomicina ya que bloquea la absorción de las penicilinas orales.
No usar conjuntamente con antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana ya que pueden antagonizar la acción bactericida de las penicilinas.

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios

Sobredosificación
Tiene un amplio margen de seguridad.
En el caso de presentarse reacciones alérgicas intensas suspender el tratamiento y administrar corticoides y adrenalina. En los demás casos administrar tratamiento sintomático

Precauciones especiales para la persona que administra el producto a los animales
Las penicilinas y cefalosporinas pueden producir reacciones de hipersensibilidad (alergias) tras la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. Se observan reacciones de hipersensibilidad cruzada entre cefalosporinas y penicilinas
No manipule el producto si es alérgico a las penicilinas y/o cefalosporinas.
Manipular el producto con cuidado para evitar inhalar el polvo, así como el contacto con la piel y los ojos, tomando precauciones específicas.
Tomar las medidas adecuadas para evitar la diseminación de polvo durante la incorporación del producto al agua de bebida/pienso.
Llevar una mascarilla antipolvo (conforme con la norma EN 140DDP1), guantes, mono de trabajo y gafas de seguridad aprobadas.
Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua clara.
No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.
Si aparecen síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar estas advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente.

Conservación
Mantener en su envase original, en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz. Conservar a temperatura inferior a 30ºC

Tiempo de espera
Carne 3 días.

Estabilidad
La estabilidad de la premezcla en el pienso es de 6 meses.
Las condiciones de temperatura, presión y humedad a las que puede someterse la premezcla para granulación son las habituales en estos casos, es decir, temperatura de hasta 80ºC, 16 % de humedad y presión máxima de 10 bares.

Advertencias especiales

Utilizar únicamente para la indicación terapéutica autorizada.

“Para piensos medicamentosos previa receta veterinaria”
“Mantener fuera del alcance de los niños”

Lote: Cad: Nº de Registro: 1166 ESP

Titular de la autorización de comercialización:

Virbac, S,A, 1 ère Avenue 2065 m L.I.D. – 06511 Carros (Francia)

Fabricante responsable de la liberación del lote:

FC France SAS, 8-10 Rue des Aulnaies – 95420 Magny-en-Vexin

O

Virbac, S,A, 1 ère Avenue 2065 m L.I.D. – 06511 Carros (Francia)

Comercializador
Virbac, España, S.A.- Espulgues de Llobregat (Barcelona)

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo, deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes