

## ANEXO III

### TEXTO PROSPECTO

#### EQ-ZONA

#### GRANULADO ORAL

##### COMPOSICIÓN:

Fenilbutazona.....	1 g
Colorante naranja A-1 (E-110).....	2 mg
Excipientes c.s.p.....	5 g

##### INDICACIONES:

Procesos inflamatorios de los équidos, excepto los que cursan con lesiones de la mucosa intestinal.

Inflamaciones agudas localizadas del aparato locomotor, como artritis, tendinitis, miositis, sinovitis, infosura, etc.

Traumatismos en general.

Tratamientos post-quirúrgicos de todo tipo como suturas de heridas cutáneas, cirugía del aparato locomotor. Cirugía abdominal, etc. (no interfiere en el proceso de cicatrización).

Dolor en general, ya sea causante de cojera o de cualquier otra claudicación funcional.

##### ESPECIES DE DESTINO:

Équidos.

##### DOSIS, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

El granulado se debe administrar siempre mezclado con la ración diaria, bajo la pauta posológica siguiente:

- Día 1: 4,4 mg/Kg cada 12 horas
- Día 2-5: 2,2 mg/Kg cada 12 horas
- Día 6 en adelante: 2,2 mg/Kg cada 24 horas

Esta posología equivale, para un caballo adulto de un peso aproximado de 500 Kg a:

- Día 1: 2 sobres cada 12 horas
- Día 2-5: 1 sobre cada 12 horas
- Día 6 en adelante: 1 sobre cada 24 horas

Es imprescindible que el caballo disponga siempre de agua o bebida en abundancia.

##### CONTRAINDICACIONES:

Lesiones degenerativas de la mucosa intestinal. Deshidratación. Insuficiencia renal. Insuficiencia hepática.

##### REACCIONES ADVERSAS:

El uso prolongado puede causar lesiones gastrointestinales. Se ha observado edema ocasional de las extremidades.

##### UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTACIÓN:

No se recomienda su empleo en hembras gestantes ni en periodo de lactación.

##### INTERACCIONES:

Barbitúricos, corticoides y anticoagulantes (potenciación). Prostaglandinas (efecto prostaglandínico).

##### SOBREDOSIFICACIÓN:

El margen de seguridad es amplio. En caso de sobredosificación accidental retirar la medicación y administrar abundante agua potable bicarbonatada. Tratamiento sintomático.

##### ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO

No usar 7 días antes de las carreras en animales de competición, pues puede dar positivo en el control antidopaje.

##### TIEMPO DE ESPERA:

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

##### CONSERVACIÓN:

Mantener en lugar fresco y seco.

CORREO ELECTRÓNICO

smuwaem@aemps.es

F-DMV-01-12



Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

De Uso veterinario -medicamento sujeto a prescripción veterinaria-

**LABORATORIOS CALIER, S.A.**

**C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)**

LES FRANQUESES DEL VALLÉS (Barcelona)