

## PROSPECTO

### Advantage para perros

#### 1. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

##### Titular de la autorización de comercialización

Elanco Animal Health GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim

Alemania

##### Fabricante

KVP Pharma + Veterinär Produkte, GmbH  
Projensdorfer str. 324  
24106 Kiel - Alemania

##### Representante local

Ecuphar Veterinaria S.L.U.  
Av. Río de Janeiro, 60 – 66, planta 13  
08016 Barcelona (España)

#### 2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ADVANTAGE 40 PARA PERROS, solución para unción dorsal puntual  
ADVANTAGE 100 PARA PERROS solución para unción dorsal puntual  
ADVANTAGE 250 PARA PERROS solución para unción dorsal puntual  
ADVANTAGE 400 PARA PERROS solución para unción dorsal puntual  
Imidacloprid

#### 3. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRAS SUSTANCIAS

Sustancia activa:  
10% (100 mg/ml) de imidacloprid

Excipientes:  
0,1% (1 mg/ml) de butilhidroxitolueno (E 321)  
Alcohol bencílico

Cada pipeta contiene:

	Pipeta	Imidacloprid	E321
Advantage 40 para Perros (< 4 kg)	0,4 ml	40 mg	0,4 mg
Advantage 100 para Perros ( $\geq 4$ a <10 kg)	1,0 ml	100 mg	1,0 mg
Advantage 250 para Perros ( $\geq 10$ a <25 kg)	2,5 ml	250 mg	2,5 mg
Advantage 400 para Perros ( $\geq 25$ kg)	4,0 ml	400 mg	4,0 mg

#### 4. INDICACIONES

Para la prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas y tratamiento de las infestaciones por piojos masticadores (*Trichodectes canis*) en perros.

Las pulgas en el perro son eliminadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del medicamento. Un tratamiento previene una posterior infestación por pulgas durante cuatro semanas. El medicamento puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP), cuando ésta se haya diagnosticado previamente por un veterinario.

#### 5. CONTRAINDICACIONES

No tratar a los cachorros no destetados de menos de 8 semanas de edad.

No usar en animales con hipersensibilidad a la sustancia activa o a alguno de los excipientes.

#### 6. REACCIONES ADVERSAS

El medicamento tiene un sabor amargo y de modo ocasional, si el perro lame el punto de aplicación inmediatamente después del tratamiento, puede producirse salivación. Este efecto no es un signo de intoxicación y desaparece al cabo de unos minutos sin necesidad de tratamiento.

En muy raras ocasiones, pueden producirse reacciones cutáneas tales como pérdida de pelo, enrojecimiento, picores y lesiones en la piel. También se ha notificado agitación y desorientación. Excepcionalmente, se ha notificado en perros salivación excesiva y signos nerviosos tales como descoordinación, temblor y depresión.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

#### 7. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

#### 8. DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Siga las instrucciones del veterinario sobre el uso de este medicamento.

*Dosificación y Esquema de tratamiento*

Perro (kg peso)	Medicamento	Número de pipetas	Imidacloprid (mg/kg peso)
Menos de 4 kg	Advantage 40 para Perros	1 x 0,4 ml	mínimo de 10
4 a menos de 10 kg	Advantage 100 para Perros	1 x 1,0 ml	mínimo de 10
10 a menos de 25 kg	Advantage 250 para Perros	1 x 2,5 ml	mínimo de 10
25 a menos de 40 kg	Advantage 400 para Perros	1 x 4,0 ml	mínimo de 10
40 kg y superior	Advantage 400 para Perros	2 x 4,0 ml	mínimo de 10


Pueden seguir produciéndose reinfestaciones por aparición de nuevas pulgas en el ambiente durante seis semanas o más después de haber iniciado el tratamiento. En consecuencia, puede ser necesario más de un tratamiento, dependiendo de la cantidad de pulgas en el ambiente. Como ayuda, se recomienda el empleo adicional en el hábitat del animal de un tratamiento adecuado contra pulgas adultas y sus fases de desarrollo.

El medicamento sigue siendo eficaz aunque el animal se moje, por ejemplo después del baño o de una exposición a lluvia intensa. No obstante, en aquellos casos en que el baño es frecuente, puede ser necesario el retratamiento dependiendo de la presencia de pulgas en el ambiente. En estos casos no aplicar con una frecuencia superior a una vez por semana.

En caso de infestación por piojos masticadores, se recomienda un examen veterinario 30 días después del tratamiento dado que algunos animales pueden requerir un segundo tratamiento.


#### *Forma de administración*

Extraiga una pipeta del estuche. Para perros de 40 kg de peso y de peso superior use dos pipetas (Advantage 400 para Perros). Mantenga la pipeta derecha, gire el tapón y retírelo. Use el tapón colocado en sentido inverso para, mediante un giro, perforar la pipeta.




#### Para perros de menos de 25 kg de peso:

Con el perro en posición de pie, separe el pelo entre las escápulas hasta que la piel sea visible. Coloque la parte superior de la pipeta sobre la piel y apriete firmemente la pipeta varias veces para depositar todo su contenido.



#### Para perros de 25 kg o de peso superior:

Para facilitar la aplicación, el perro debe estar en posición de pie. Se aplicará todo el contenido de la pipeta repartido uniformemente en tres o cuatro puntos sobre la línea dorsal del animal desde la zona escapular hasta la base de la cola. Separe el pelo de cada punto de aplicación hasta que la piel sea visible.



Coloque la parte superior de la pipeta directamente sobre la piel y apriete la pipeta con suavidad para depositar parte de su contenido.

## 9. RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Únicamente para uso externo.

No aplicar una cantidad excesiva de la solución en un mismo punto ya que podría deslizarse por el costado del perro.

Una aplicación correcta minimizará la oportunidad del perro de lamer el medicamento, véase la sección *Reacciones adversas*.

Aplicar únicamente sobre piel sana. No dejar que los animales recién tratados se laman unos a otros.

## 10. TIEMPO DE ESPERA

No procede.

## 11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Mantener el blister en la caja.

## 12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

### Precauciones especiales para su uso en animales

Este medicamento debe aplicarse únicamente sobre la piel. No administrar por vía oral.

Es poco probable que se produzca intoxicación en el animal tras una ingestión accidental del medicamento. Si se diera el caso, el tratamiento deberá ser sintomático bajo atención veterinaria. No se conoce antídoto específico pero puede ser beneficiosa la ingesta de carbón activado. Debe evitarse el contacto del contenido de la pipeta con los ojos o la boca del animal receptor. No dejar que los animales recién tratados se laman unos a otros.

El imidacloprid es tóxico para los organismos acuáticos. No debe permitirse que los perros tratados entren en contacto con el agua superficial durante las 48 horas posteriores al tratamiento, para evitar efectos adversos en los organismos acuáticos.

### Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento a los animales

Lavarse las manos después de la aplicación del medicamento.

Lavar con agua y jabón la piel expuesta al medicamento.

Las personas con hipersensibilidad cutánea conocida pueden ser especialmente sensibles a este medicamento.

Evitar el contacto del medicamento con los ojos y la boca.

En caso de contacto ocular accidental, deben lavarse los ojos con agua abundante. Si persiste la irritación en los ojos o en la piel, o si de modo accidental se ingiere el medicamento, acudir al médico.

No comer, beber o fumar durante la aplicación.

### **13. PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

### **14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ**

Noviembre 2023

### **15. INFORMACIÓN ADICIONAL**

Formatos: pipetas que contienen 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml o 4,0 ml. Caja que contiene 1, 2, 3, 4 o 6 pipetas monodosis.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Además de la eficacia como adulticida contra pulgas de imidacloprid, en otros estudios se ha demostrado su eficacia como larvicida en el entorno del animal tratado. Las larvas presentes en el entorno del animal mueren tras contacto con el animal tratado.

El solvente de este medicamento puede manchar determinados materiales, como plásticos, cueros, tejidos y superficies pulidas. Deje secar la zona de aplicación del medicamento antes de permitir el contacto con este tipo de materiales.

No se han observado efectos primarios embriotóxicos, teratogénicos o sobre la función reproductora durante los estudios efectuados con imidacloprid sobre ratas y conejos. Los estudios sobre las perras en gestación y lactación junto con su camada son limitados. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia que sugiera que deban esperarse efectos adversos en estos animales.

No se ha observado incompatibilidad entre este medicamento a dos veces la dosis recomendada y los siguientes medicamentos veterinarios empleados comúnmente: fentión, lufenuron, milbemicina, febantel, pirantel y prazicuantel. Asimismo, se demostró la compatibilidad del medicamento con una amplia gama de tratamientos rutinarios bajo condiciones de campo incluyendo la vacunación.

Advantage 40 para perros: 1181 ESP

Advantage 100 para perros: 1182 ESP

Advantage 250 para perros: 1183 ESP

Advantage 400 para perros: 1270 ESP