



DOXIDOL ENDOVENOSO

(Doxiciclina)
Solución inyectable

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN

Doxiciclina (monohidrato)	10,0 g
Formaldehído sulfoxilato sódico	1,0 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES

DOXIDOL ENDOVENOSO es una solución inyectable por vía endovenosa para el tratamiento de afecciones respiratorias en ganado bovino. Su principio activo, doxiciclina, es un antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis de las proteínas bacterianas a nivel ribosomal. Su espectro de acción comprende bacterias como *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*.

Debido a su liposolubilidad, la doxiciclina se distribuye más rápidamente y a mayor concentración que otras tetraciclinas por todos los órganos y tejidos. Los niveles plasmáticos tras administración i.v. se mantienen 18-24 horas.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos

INDICACIONES

Neumonías causadas o complicadas por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

VÍA INTRAVENOSA LENTA

Bovinos: 1 ml/10 kg p.v. cada 24 horas durante 2-3 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Administrar lentamente el producto (no menos de 3 minutos).

EFFECTOS ADVERSOS

Como todas las tetraciclinas, puede ocasionar reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.

En caso de extravasación del producto, se puede producir periflebitis, por lo que es necesario inyectar con sumo cuidado.

Cuando la inyección endovenosa se aplica con excesiva rapidez, y especialmente en terneros de menos de 100 kg, puede aparecer:

- Incoordinación, ataxia e incluso colapso transitorio que remite espontáneamente.
- En algunos animales se ha detectado taquipnea transitoria durante 5 a 10 minutos. Este hecho corresponde a una predisposición individual.

INCOMPATIBILIDADES

No se conocen

INTERACCIONES

No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas.

Se presenta resistencia cruzada con otras tetraciclinas.

La absorción de la doxiciclina se puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han realizado estudios con la especialidad a dosis y periodo de administración superiores a los recomendados, por lo que se aconseja no superar la posología propuesta.

PERIODO DE SUPRESION

Carne : 19 días

Leche: No usar

PRESENTACIÓN

Caja con un vial de 50 ml.

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Conservar entre 2° y 8°C.

Una vez abierto el envase, el producto se mantiene estable durante 21 días.

PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

No administrar a hembras gestantes o en lactación.	Mantener fuera del alcance de los niños
CONTRAINDICACIONES No administrar a animales con antecedentes de sensibilización a las tetraciclinas. No administrar a animales con alteraciones hepáticas graves.	Producto registrado con el nº 1338 ESP Fabricado por Labiana Life Sciences S.A. - Venus, 26 · 08228 Terrassa (Barcelona) Fatro Ibérica S.L. C/ Constitución 1; Planta Baja 3 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

 <u>DOXIDOL ENDOVENOSO</u> (Doxiciclina) Solución inyectable	
USO VETERINARIO	
COMPOSICIÓN	
Doxiciclina (monohidrato)	10,0 g
Formaldehído sulfoxilato sódico	1,0 g
Excipiente c.s.p.	100 ml
PROPIEDADES	
	EFFECTOS ADVERSOS Como todas las tetraciclinas, puede ocasionar reacciones alérgicas y de fotosensibilidad. En caso de extravasación del producto, se puede producir periflebitis, por lo que es necesario inyectar con sumo cuidado. Cuando la inyección endovenosa se aplica con excesiva rapidez, y especialmente en terneros de menos de 100 kg, puede aparecer: - Incoordinación, ataxia e incluso colapso transitorio que remite espontáneamente. - En algunos animales se ha detectado taquipnea transitoria durante 5 a 10 minutos. Este hecho corresponde a una predisposición individual.
	INCOMPATIBILIDADES No se conocen
	INTERACCIONES No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas.

DOXIDOL ENDOVENOSO es una solución inyectable por vía endovenosa para el tratamiento de afecciones respiratorias en ganado bovino. Su principio activo, doxiciclina, es un antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis de las proteínas bacterianas a nivel ribosomal. Su espectro de acción comprende bacterias como *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*.

Debido a su liposolubilidad, la doxiciclina se distribuye más rápidamente y a mayor concentración que otras tetraciclinas por todos los órganos y tejidos. Los niveles plasmáticos tras administración i.v. se mantienen 18-24 horas.

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos

INDICACIONES

Neumonías causadas o complicadas por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

VÍA INTRAVENOSA LENTA

Bovinos: 1 ml/10 kg p.v. cada 24 horas durante 2-3 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Administrar lentamente el producto (no menos de 3 minutos).

No administrar a hembras gestantes o en lactación.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con antecedentes de sensibilización a las tetraciclinas.

No administrar a animales con alteraciones hepáticas graves.

Se presenta resistencia cruzada con otras tetraciclinas.

La absorción de la doxiciclina se puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han realizado estudios con la especialidad a dosis y periodo de administración superiores a los recomendados, por lo que se aconseja no superar la posología propuesta.

PERIODO DE SUPRESION

Carne : 19 días

Leche: No usar

PRESENTACIÓN

Caja con un vial de 50 ml.

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Conservar entre 2° y 8°C.

Una vez abierto el envase, el producto se mantiene estable durante 21 días.

PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Mantener fuera del alcance de los niños

Producto registrado con el nº 1338 ESP

Fabricado por Labiana Life Sciences S.A. - Venus, 26 · 08228 Terrassa (Barcelona)

Fatro Ibérica S.L.

C/ Constitución 1; Planta Baja 3 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

