

## **TEXTO DEL PROSPECTO**

MAXIVAC® PRIMA DP

**Vacuna viva atenuada, Parvovirus, Moquillo caninos.**

**COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ml):**

Virus del Moquillo Canino atenuado, cepa Lederle .....  $\geq 10^5$  DICT<sub>50</sub>

Parvovirus Canino, cepa C-780916 atenuada .....  $\geq 10^7$  DICT<sub>50</sub>

El Parvovirus canino (CPV) es un agente causal de trastornos digestivos en perros, especialmente en cachorros hasta los 6 meses de edad. El Virus del Moquillo Canino (CDV) es un agente etiológico responsable de trastornos nerviosos y respiratorios y diarreas en perros, sobretodo en las primeras semanas de vida.

Las madres vacunadas antes del parto transfieren a su descendencia anticuerpos frente a CPV y CDV a través de la placenta y el calostro. El alto contenido antigénico de CPV y CDV en MAXIVAC PRIMA DP permite una mayor eficacia en la inducción de una respuesta inmune en cachorros durante el periodo de interferencia de los anticuerpos maternos

### **INDICACIONES:**

**Perros:** Prevención de la Parvovirus y el Moquillo, a partir de las 8 semanas de edad.

### **POSOLOGÍA Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN:**

**Perros:** Administrar una dosis de 1 ml / perro por vía subcutánea, independientemente de su edad, peso, sexo y raza.

### **PROGRAMA VACUNAL RECOMENDADO:**

**Cachorros:** Primera vacunación a las 8 semanas. Revacunación a las 12 semanas. Revacunación anual.

### **CONTRAINDICACIONES:**

- No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o que estén incubando una enfermedad infecto-contagiosa.
- No administrar en hembras gestantes.

### **OBSERVACIONES:**

- Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse el tratamiento sintomático adecuado.

### **PRECAUCIONES:**

- Vacunar únicamente animales sanos y desparasitados.
- Usar material estéril para su administración.
- Usar la vacuna en el plazo máximo de una hora, una vez reconstituida.
- Conservar en un lugar oscuro entre +2 y +8 °C. No congelar.
- No mezclar con otras vacunas.
- Tomar las precauciones habituales para evitar la inoculación accidental a la persona que administra la vacuna.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

### **TIEMPO DE ESPERA:**

No aplicable.

### **PRESENTACION:**

Caja de 1 dosis: 1 frasco con liofilizado inyectable de 1 dosis y 1 frasco con 1 ml de suspensión.

Caja conteniendo 10 dosis (10 viales de fracción liofilizada + 10 viales de fracción líquida).

### **Prescripción veterinaria**

USO VETERINARIO

Reg. nº 1404 ESP



**Titular y fabricante:**  
**LABORATORIOS HIPRA, S.A.**  
Avda. La Selva, 135  
17170 AMER – GIRONA (España)  
**Representante del titular:**  
**Ecuphar Veterinaria. S.L.U.**  
C/Cerdanya, 10-12 Planta 6º  
08173 Sant Cugat del Vallés  
(España)