ETIQUETA-PROSPECTO:

DOXBROM

polvo para administración en agua de bebida
Hiclato de doxiciclina

Composición
Doxiciclina (hiclato) 500 mg, excipientes, c.s.p. 1 g

Indicaciones de uso
Aves (Pollos de carne): Colibacilosis, C.R.D., micoplasmosis. Producidas por gérmenes sensibles a la doxiciclina.
Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

Contraindicaciones
No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.
No administrar a animales con alteraciones hepáticas

Reacciones adversas
Como para todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad. En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal

Especies de destino
Aves (Pollos de carne)

Posología para cada especie, modo y vía de administración
Administración por vía oral, en agua de bebida
Pollos: 10 – 20 mg de doxiciclina (hiclato)/kg de peso vivo/día, equivalente a 20 – 40 mg de DOXBROM por kg de peso vivo, durante 3 – 5 días consecutivos.

Instrucciones para una correcta administración
Deben seguirse las siguientes recomendaciones de administración:
10 – 20 mg de doxiciclina (hiclato)/kg de peso vivo/día, equivalente a 20 - 40 mg de DOXBROM por kg de peso vivo, durante 3 - 5 días consecutivos.
Según la dosis recomendada y el número y el peso de las aves que deben recibir tratamiento, se debe calcular la dosis diaria exacta de DOXBROM aplicando la fórmula siguiente:

$$\frac{\text{20 – 40 mg DOXBROM/kg Peso vivo/día} \times \text{Peso vivo medio (kg) de las aves que recibirán tratamiento}}{\text{Consumo diario medio de agua (l) por ave}} = \text{mg DOXBROM por litro de agua de bebida}$$

Para asegurar una dosificación correcta, el peso vivo se debe determinar con la mayor precisión posible.
El consumo de agua medicada depende de la condición clínica del animal. Para asegurar una dosificación correcta, la concentración de doxiciclina en el agua de bebida tiene que estar ajustada debidamente.

Se recomienda el uso de un equipo de pesada debidamente calibrado si se utiliza parte del contenido de un envase. La dosis diaria debe añadirse al agua de bebida que vaya a consumirse en 24 horas. El agua medicada deberá prepararse nueva cada 12 horas. Se

recomienda preparar una presolución concentrada -con aproximadamente 100 g de producto por litro de agua de bebida- y diluirla hasta alcanzar las concentraciones terapéuticas en caso necesario. La solución concentrada se puede utilizar también con un dosificador proporcional de agua medicada.

Tiempo de espera
Carne de pollo: 7 días

Precauciones especiales de conservación
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños
Conservar en lugar seco, fresco (temperatura inferior a 25 ºC) y protegido de la luz.
Período de validez después de abierto el envase: 3 meses
Período de validez después de su disolución según las instrucciones: 12 horas

Advertencias especiales

Advertencias especiales para cada especie de destino
No administrar a aves ponedoras.

Precauciones especiales para su uso en animales
Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.
La resistencia de las bacterias a la doxiciclina puede variar (en el tiempo, geográficamente), por lo que es altamente recomendable obtener muestras bacteriológicas y realizar pruebas de sensibilidad de los microorganismos aislados de aves enfermas en las granjas.
Se ha documentado una elevada tasa de resistencia a la tetraciclina de cepas *de E. coli* aisladas en pollos. Por consiguiente, este medicamento no debe usarse para el tratamiento de infecciones causadas por *E. coli* hasta no haber realizado pruebas de sensibilidad.
No siempre se consigue erradicar a los patógenos responsables de la enfermedad, razón por la cual debe combinarse la medicación con unas buenas prácticas de gestión, como una buena higiene, una ventilación adecuada y unas explotaciones no sobrecargadas.
Evitar su administración en bebederos oxidados

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales
No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.
Las personas que manejan el producto deben evitar el contacto con la preparación.

Gestación y lactancia
No usar en aves ponedoras

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
La absorción de la doxiciclina se puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al de la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

Incompatibilidades
No formular con sustancias higroscópicas, cationes di y/o trivalentes, sustancias oxidantes y sustancias con carácter ácido
No mezclar con ningún otro medicamento veterinario

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Fecha en que fue aprobada la etiqueta-prospecto por última vez: Enero de 2018

Información adicional
Formatos: Bolsa de 200 g
Bolsa de 1 kg
Bidón con 5 bolsas de 1 kg
Bidón con 10 bolsas de 1 kg
Bidón con 25 bolsas de 1 kg
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

USO VETERINARIO –
MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
ADMINISTRACIÓN BAJO CONTROL O SUPERVISIÓN DEL VETERINARIO

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:

SUPER'S DIANA, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona) ESPAÑA

FECHA DE CADUCIDAD
CAD {mes/año}
Una vez abierto, utilizar antes de ……..……..…

TAMAÑO DEL ENVASE
200 g
1 kg
5 x 1 kg
10 x 1 kg
25 x 1 kg

NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
1408 ESP

NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN
Lote {número}