ETIQUETA-PROSPECTO:
SUIDOX SOLUCIÓN ORAL
Solución oral para administración en agua de bebida

CN:
O

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL, DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y
fabricante responsable de la liberación de los lotes:

SUPER'S DIANA, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 Parets del Vallès (Barcelona) ESPAÑA

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SUIDOX SOLUCION ORAL

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada ml contiene:
Sustancia activa:
Doxiciclina (hiclato) ..... 100,00 mg

Excipientes:
Alcohol bencílico ..... 20,90 mg
Otros excipientes c.s.

TAMAÑO DEL ENVASE
Bidón de 5 litros

INDICACIONES DE USO Y ESPECIES DE DESTINO
Porcino (cerdos de cebo): Síndrome Respiratorio Porcino donde se encuentren implicados, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* y/o *Bordetella bronchiseptica*, sensibles a la doxiciclina.

CONTRAINDICACIONES
No usar en animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.
No usar en animales con alteraciones hepáticas.

REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.
Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en esta etiqueta - prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdos de cebo)

POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía oral en el agua de bebida.
La posología es de 10 mg de doxiciclina/kg de peso vivo y día, equivalente a 1 ml de SUIDOXSOLUCION ORAL por litro de agua de bebida. La duración del tratamiento es de 5 días. Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
No procede

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 7 días

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura inferior a 25 ºC.
Proteger de la luz.

Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato
Período de validez después de su disolución según las instrucciones: 12 horas

ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Advertencias especiales para cada especies de destino
No usar en animales jóvenes en período de crecimiento.

Precauciones especiales para su uso en animales
Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.
Evitar la exposición solar en animales administrados con doxiciclina, sobre todo los de capa clara.
Evitar la administración en bebederos oxidados.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales
No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.
Manipular el producto con cuidado para evitar el contacto durante su incorporación al agua, así como durante la administración del agua medicada a los animales, tomar las precauciones específicas:

- Se evitará todo contacto con el agua medicada mediante el uso de guantes y se tomarán las precauciones necesarias para evitar salpicaduras.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua clara.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.

Si aparecen síntomas tras exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar dichas advertencias. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente.

Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

Su uso no está recomendado durante la gestación y la lactancia

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
La absorción de la doxiciclina puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca^{++}, Fe^{++}, Mg^{++} o Al^{+++} en la dieta.
No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

Sobredosificación
En caso de sobredosificación se suspenderá el tratamiento y se establecerá un tratamiento sintomático.

Incompatibilidades
No formular con sustancias higroscópicas, cationes di y/o trivalentes, sustancias oxidantes y sustancias con carácter ácido.
No mezclar con ningún otro medicamento veterinario

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

FECHA EN QUE FUE APROBADA LA ETIQUETA- PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Enero de 2018

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nº Registro: 1758 ESP

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS

Lote:
Cad.:

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA ADMINISTRACIÓN BAJO CONTROL O SUPERVISIÓN DEL VETERINARIO

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios