

PROSPECTO

DOSALID 1200 mg

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:

Zoetis Spain, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
Edificio nº 1
c/ Quintanavides nº 13
28050 Madrid
España

Fabricante que libera el lote:

Farmasierra Manufacturing, S.L.
Carretera de Irún; km 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes
España

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dosalid 1200 mg

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada comprimido contiene:

Sustancias activas

Epsiprantel	100,00 mg
Pirantel	90,80 mg
(como embonato de pirantel)	(261,60) mg

Excipientes:

- Almidón de maíz pregelatinizado
- Lauril sulfato de sodio
- Sílice coloidal anhidra
- Almidón de maíz
- Celulosa microcristalina
- Estearato de magnesio
- Lactosa monohidrato
- Residuo sólido de Opadry Color naranja YS-1-2558 que contiene:
 - Amarillo naranja S (E-110)
 - Dióxido de Titanio (E-171)
- Polietilenglicol 8000

4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Dosalid 1200 mg es un antihelmíntico para el tratamiento de las infecciones por tenias (cestodos) y áscaris/ancilostomas (nematodos) en los perros. Se ha demostrado que es eficaz frente a los siguientes parásitos adultos:

Tenias (cestodos): *Dipylidium caninum*,
Taenia hydatigena,
Taenia pisiformis y
Echinococcus granulosus

Ascáridos: *Toxocara canis* (sólo formas adultas en animales adultos) y
Toxascaris leonina.

Ancilostomas: *Uncinaria stenocephala* y *Ancylostoma caninum*

5. CONTRAINDICACIONES

No tratar a cachorros de menos de un mes.

6. REACCIONES ADVERSAS

Con independencia de la dosis administrada, se pueden observar la eliminación de heces blandas y un aumento transitorio de la fosfatasa alcalina y del BUN.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Perros

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Dosalid 1200 mg está diseñado para la administración oral solamente.

No es necesario ni se recomienda que los animales estén en ayunas.

La dosis recomendada es de 10,5 mg/kg de las sustancias activas combinadas, consistente en 5,5 mg/kg de epsiprantel y 5,0 mg/kg de pirantel (embonato), equivalente a 1 comprimido por cada 18 kg p.v.

El programa de dosificación recomendado es el siguiente:

Peso vivo (kg)	Número de comprimidos por dosis
7 – 9	½
10 - 18	1
19 – 27	1 ½

28 – 36	2
37 – 54	3
Más de 55	4

Teniendo en cuenta el ciclo biológico del parásito que se quiere tratar, y el entorno en el que estén los animales tratados, se establecerá la frecuencia de administración del medicamento

Debe prestarse atención al control de la reinfección del perro mediante un cuidado escrupuloso de la higiene y el control de hospedadores intermediarios como las pulgas, así como evitar el acceso a alimentos contaminados (por ejemplo, conejo salvaje crudo)

Dada la elevada patogenicidad para la persona, en el caso de diagnóstico de infección por *E. granulosus*, se requerirá un segundo tratamiento que presuponga un eficacia del 100%.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

No procede

10. TIEMPO DE ESPERA

No procede.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
Conservar a temperatura inferior a 25°C

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Advertencias especiales para cada especie de destino

Su uso en animales destinados a la reproducción puede producir un descenso en el índice de fertilidad y de partos.

Precauciones especiales para su uso en animales

Se puede desarrollar resistencia a un tipo particular de antiparasitario después de un uso repetido de éste.

Con el fin de garantizar el adecuado tratamiento y disminuir el desarrollo de resistencias el veterinario fijará un adecuado programa de desparasitación para cada uno de los casos.

Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

Su uso en animales destinados a la reproducción puede producir un descenso en el índice de fertilidad y de partos

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No utilizar simultáneamente con compuestos de piperacina.

Sobredosificación

Cinco veces la dosis terapéutica en perros adultos y cachorros jóvenes, no indujo ningún signo de intolerancia

Los síntomas en caso de intoxicación aguda son: vómitos y diarrea.

No se conocen antídotos, se aconseja el tratamiento sintomático.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Junio 2020

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Formatos: DOSALID 1200 mg se suministra en cajas de 2, 4, 10, 20, ó 100 comprimidos (2 o 20 comprimidos por blíster).

Caja con 2 comprimidos (1blister).

Caja con 4 comprimidos (2 blister).

Caja con 10 comprimidos (5 blister).

Caja con 20 comprimidos (1 blister).

Caja con 100 comprimidos (5 blister).

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Nº de registro: 1818 ESP

Uso veterinario – Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.