PROSPECTO PARA:

FisioVet solución inyectable
Cloruro de sodio

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:
B. Braun VetCare SA
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)

Fabricante responsable de la liberación del lote:
B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FisioVet solución inyectable
Cloruro de sodio

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada 1 ml contiene:

Sustancia activa:

Cloruro de sodio	9 mg

Excipientes:

Agua para preparaciones inyectables, c.s.	1 ml

Electrolitos	mmol/l (mEq/l)
Na^+	154
Cl^-	154

4. INDICACIONES DE USO

Para todas las especies de destino se emplea en:

- Disolvente de medicamentos de administración parenteral
- Solución de transporte para medicación complementaria.
- Externamente para irrigación de heridas y humedecimiento de vendajes.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con:
- Retención hidrosalina.
- Insuficiencia cardiaca.
- Síndrome de edema ascítico.

6. REACCIONES ADVERSAS

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

- La existencia de una relación sodio/cloro diferente a la del plasma produce una disminución de la concentración de bicarbonatos dando acidosis.
- Riesgo de hipopotasemia debido a la eliminación urinaria de cloruros.
- La administración inadecuada o excesiva puede producir hipernatremia con la consiguiente deshidratación.
- Ante la aparición de reacciones adversas, detener la inyección y tratar sintomáticamente

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, equino, ovino, caprino, porcino, perros y gatos.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa.

La dosis debe de ajustarse en cada caso, según las necesidades que imponga el estado del paciente bajo control veterinario.

Dependiendo de cada situación, el veterinario determinará la cantidad y velocidad de administración.

Para evitar un posible shock térmico, atemperar la solución hasta aproximar su temperatura a la del paciente.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

No reutilizar una vez abierto el envase.

10. TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.
Periodo de validez después de abierto el envase primario: Uso inmediato
No usar después de la fecha de caducidad que figura en el envase después de CAD. ó EXP.

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales para cada especie de destino:
Ninguna

Precauciones especiales para su uso en animales:
No procede

Precauciones específicas que debe de tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:
Las normales en el uso de inyectables por perfusión.
No utilizar si el envase presenta signos de deterioro o si la solución presenta partículas sólidas visibles.

Uso durante la gestación, lactancia o puesta:

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Ninguna conocida

Sobredosificación (síntomas, medidas de emergencia, antídotos):
La administración de un exceso de solución puede dar lugar a: hipertensión arterial, edema pulmonar, edema cerebral, edema subcutáneo.

La sobrecarga hidrolítica se manifiesta por agitación e hipersalivación: en estos casos, es conveniente disminuir drásticamente la velocidad de inyección.

En caso de sobredosificación es necesario disminuir la velocidad de inyección, monitorizar al paciente, realizar un control de la diuresis e instaurar un tratamiento para restaurar el equilibrio electrolítico.

Incompatibilidades:
Ninguna conocida. Únicamente deben comprobarse incompatibilidades en caso de que se adicionen algún medicamento a la solución.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

11 de junio de 2013.

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Naturaleza y composición del acondicionamiento primario
El medicamento se presenta en ampollas de polietileno de baja densidad (Mini-Plasco) de 5, 10 y 20 ml de capacidad.

Formatos:
Cajas con 20 ampollas de 5 ml
Cajas con 20 ampollas de 10 ml
Cajas con 20 ampollas de 20 ml

USO VETERINARIO

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria
Administración exclusiva por el veterinario