



PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

Endogard comprimidos para perros grandes

2. Composición

Cada comprimido contiene:

Prazicuantel	175 mg
Pirantel embonato	504 mg
Febantel	525 mg

Comprimidos ovalados, biconvexos, de color amarillo ligeramente verdoso, con bordes biselados y ranurados en ambas caras.

Los comprimidos se pueden dividir en dos partes iguales.

3. Especies de destino

Perros con un peso corporal de al menos 17,5 kg.

4. Indicaciones de uso

Para el tratamiento de infestaciones mixtas con los siguientes nematodos y cestodos en perros adultos:

Nematodos:

Ascáridos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (formas inmaduras tardías y formas maduras)

Anquilostomas: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultos)

Cestodos:

Tenias: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*

5. Contraindicaciones

No usar simultáneamente con compuestos piperazínicos.

No usar en casos de hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.

No superar la dosis establecida al tratar a perras gestantes.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

Las pulgas sirven de hospedador intermedio para un tipo común de cestodo, *Dipylidium caninum*. La infestación por cestodos es probable que suceda a no ser que se controle a hospedadores intermedios como pulgas, ratones, etc.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

No se recomienda el uso de este medicamento veterinario en perros que pesen menos de 17,5 kg.

Las porciones de comprimido no utilizadas deben desecharse.



Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Para una correcta higiene, las personas que administren los comprimidos directamente al perro o los añadan a su comida, deben lavarse las manos después.

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Gestación:

No utilizar este medicamento en perras durante los dos primeros tercios de la gestación.

Consulte a un veterinario antes de desparasitar a animales gestantes frente a nematodos.

Lactancia:

Puede utilizarse durante la lactancia (ver “Contraindicaciones” e “Instrucciones para una correcta administración”).

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No usar simultáneamente con piperazinas, ya que los efectos antihelmínticos de pirantel y piperazina (usados en muchos nematocidas en perros) pueden ser antagonizados.

El uso concurrente con otros compuestos colinérgicos puede producir toxicidad.

Sobredosificación:

Este medicamento veterinario es bien tolerado en perros. En estudios de seguridad, dosis de hasta cinco veces la dosis recomendada dieron lugar a la aparición de vómitos ocasionales.

7. Acontecimientos adversos

Perros:

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):	Vómitos, diarrea
--	------------------

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización o al representante local del titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación: Tarjeta verde

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc

o

NOTIFICAVET <https://sinaem.aemps.es/FVVET/notificavet/Pages/CCAA.aspx>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Vía oral.

Las dosis recomendadas son: 15 mg/kg de peso corporal de febantel, 14,4 mg/kg de pirantel y 5 mg/kg de prazicuantel. Esto equivale a 1 comprimido por cada 35 kg de peso corporal.



Los comprimidos se pueden dividir en dos partes iguales.
No es necesario restringir el acceso a la comida ni antes ni después de la administración del medicamento veterinario.
El(los) comprimido(s) se puede(n) administrar directamente al perro o disimulado(s) en la comida.

9. Instrucciones para una correcta administración

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta.
Para el control de *Toxocara*, las perras lactantes deben ser tratadas 2 semanas después del parto y cada 2 semanas hasta el destete.
En caso de infestación con alta carga parasitaria por nematodos, se debe repetir la dosis tras 14 días.
Para un control rutinario se recomienda una dosis única a intervalos de 3 meses.

10. Tiempos de espera

No procede.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

2331 ESP

Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 2 comprimidos (1 blíster con 2 comprimidos), en una caja.



Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 4 comprimidos (2 blísteres con 2 comprimidos), en una caja.
Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 10 comprimidos (1 blíster con 10 comprimidos), en una caja.
Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 12 comprimidos (2 blíster con 6 comprimidos), en una caja.
Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 24 comprimidos (4 blíster con 6 comprimidos), en una caja.
Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 30 comprimidos (3 blísteres con 10 comprimidos o 5 blísteres con 6 comprimidos), en una caja.
Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 50 comprimidos (5 blísteres con 10 comprimidos), en una caja.
Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 60 comprimidos (10 blísteres con 6 comprimidos o 6 blísteres con 10 comprimidos), en una caja.
Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 100 comprimidos (10 blísteres con 10 comprimidos), en una caja.
Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 102 comprimidos (17 blísteres con 6 comprimidos), en una caja.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

11/2024

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización:

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Eslovenia

Fabricante responsable de la liberación del lote:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croacia
Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065 M LID, 06516 Carros Cedex, France
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Eslovenia

Representante local y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

VIRBAC ESPAÑA S.A.
Angel Guimerá 179-181
ES-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel: + 34 93 470 79 40

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

17. Información adicional



*Solo para el envase de 60 comprimidos

1 por cada 35 kg

SELLO DE LA CONSULTA

Nombre del propietario:.....

Nombre de la mascota:.....

Dosificación:.....