



## PROSPECTO

### HIPRAVIAR-AP

Suspensión inyectable para palomas

#### 1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva, 135.  
17170 AMER (Girona) España.

#### 2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

HIPRAVIAR-AP  
Suspensión inyectable para palomas

#### 3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada dosis de vacuna (0,2 ml) contiene:

##### Sustancias activas:

Paramixovirus-1 inactivado, cepa AP 1282 .....  $\geq 1/16$  IHA\*  
\*IHA: Título de anticuerpos obtenido mediante inhibición de la hemoaglutinación

##### Adyuvantes:

Carbomer 934..... 0,32 mg

##### Excipientes:

Tiomersal..... 0,01 mg

#### 4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Para la inmunización activa de palomas para prevenir la Paramixovirosis.

#### 5. CONTRAINDICACIONES

No procede.

#### 6. REACCIONES ADVERSAS

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

#### 7. ESPECIES DE DESTINO

Aves: Palomas (machos y hembras).

#### 8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

La posología es de 1 dosis de 0,2 ml / ave.



El método de administración es subcutánea en la parte dorsal media del cuello.

Programa vacunal recomendado:

Primovacunación: administrar una dosis (0,2 ml) de HIPRAVIAR-AP a los 30-35 días de edad.

Revacunación: realizar como mínimo una revacunación anual con una dosis (0,2 ml).

## **9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN**

Al ser una vacuna envasada en frascos multidosis es conveniente emplear toda la vacuna una vez empezado el frasco.

Agitar antes de usar.

Usar material estéril para su administración.

Administrar la vacuna cuando esté a una temperatura de unos +15°C a +25°C.

## **10. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días.

## **11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar.

Proteger de la luz.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

## **12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)**

Debe evitarse vacunar aves enfermas, vacunando sólo aves sanas.

Si la inoculación por vía subcutánea no es correcta y se realiza por vía intradérmica, puede producirse un edema regional de evolución favorable.

Puede utilizarse durante la puesta.

## **13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario ó farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

## **14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ**

Enero de 2012

## **15. INFORMACIÓN ADICIONAL**



**Formatos:**

Caja con un vial de 50 dosis (10 ml).

**Nº de Registro:** 2433 ESP

**Uso veterinario-medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

**Administración bajo control o supervisión del veterinario.**