

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

BAYCOX 25 mg/ml solución para administración en agua de bebida para pollos y pavos

2. Composición

Cada ml contiene:

Principios activos:

Toltrazurilo 25 mg

Solución transparente de incolora a marrón amarillento.

3. Especies de destino

Pollos de engorde, pollos reproductores, gallinas ponedoras y pavos.

4. Indicaciones de uso

Para el tratamiento de coccidiosis causada en pollos y pavos causada por infecciones por varias especies de *Eimeria*:

Pollos: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. mivati*.

Pavos: *Eimeria adenoides*, *E. meleagritidis*.

5. Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

Una buena higiene puede reducir el riesgo de coccidiosis. Por lo tanto, se recomienda que, además del tratamiento, se corrijan las deficiencias en la cría. Los gallineros deben mantenerse limpios y secos. Se recomienda tratar a todos los animales de un corral. Para obtener mejores resultados, el tratamiento debe iniciarse antes de que los signos clínicos de la enfermedad se hayan extendido por todo el grupo.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Al igual que con cualquier otro parasiticida, el uso frecuente y reiterado de antiprotozoarios de la misma clase puede llevar al desarrollo de resistencias.

Si existe resistencia, se debe considerar el uso de otro antiprotozoario de otra clase o mecanismo de acción. Este medicamento veterinario no debe utilizarse junto con aditivos alimentarios u otros medicamentos veterinarios que puedan interferir con la eficacia del medicamento, como coccidiostáticos e histomonostáticos.

El medicamento veterinario es una solución fuertemente alcalina y no debe administrarse sin diluir.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Las personas con hipersensibilidad conocida al toltrazurilo o al macrogol deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

El medicamento veterinario es una solución alcalina. Usar un equipo de protección individual consistente en guantes impermeables y gafas al manipular el medicamento veterinario.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y las mucosas y la ingestión. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con agua abundante. En caso de ingestión accidental o si aparecen síntomas tras la exposición, como irritación ocular o cutánea, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto o la etiqueta.

No comer, fumar o beber mientras se manipula el medicamento veterinario.

Lavar las manos después de su utilización.

Aves en periodo de puesta:

No procede, ver sección “tiempos de espera”.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

La combinación del medicamento veterinario con antibióticos puede provocar una reducción de la ingesta de agua en los pavos. Debe evitarse la administración concomitante de otras sustancias en el agua de bebida.

Sobredosificación:

Una dosis 3-5 veces superior a la dosis recomendada es bien tolerada. En caso de sobredosificación se observa un descenso del consumo espontáneo de agua.

Restricciones y condiciones especiales de uso:

Medicamento administrado bajo el control o supervisión del veterinario.

Incompatibilidades principales:

No existe información disponible sobre potenciales interacciones o incompatibilidades de este medicamento veterinario administrado por vía oral en agua de bebida que contenga productos biocidas, aditivos alimentarios u otras sustancias utilizadas en el agua de bebida.

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

7. Acontecimientos adversos

Pollos de engorde, pollos reproductores, gallinas ponedoras y pavos: Ninguno conocido.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación: Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde o NOTIFICAVET: <https://si-naem.aemps.es/fvvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Administración en agua de bebida.

Para asegurar una dosificación correcta, el peso de los animales y el consumo diario de agua deben determinarse con la mayor exactitud posible.

La dosis recomendada es de 7 mg de toltrazurilo por kg de p.v. por día, equivalente a 28 ml del medicamento por 100 kg p.v y día, durante 2 días consecutivos.

El medicamento veterinario debe administrarse de forma continua durante 24 horas al día durante 2 días consecutivos.

En caso de que se utilice un dispensador automático de dosis, el medicamento veterinario debe administrarse durante un periodo de 8 horas al día durante 2 días consecutivos.

El consumo diario de agua medicada depende de la situación clínica de los animales. En consecuencia, para asegurar una dosificación correcta, puede ser necesario ajustar la concentración de toltrazurilo en el agua

Según la dosis recomendada, el número y peso de los animales que deben recibir el tratamiento, se debe calcular la dosis diaria exacta de medicamentos aplicando la fórmula siguiente:

$$\frac{0.28 \text{ ml medicamento / kg de p.v. / día} \times \text{p.v. medio de animales a tratar (kg)}}{\text{Consumo diario medio de agua por animal (l/animal)}} = \dots \text{ml de medicamento por litro de agua de bebida}$$

El agua medicada debe ser la única fuente de bebida durante todo el tratamiento. El agua de bebida debe ser renovada cada día.

Duración del tratamiento

Este medicamento veterinario deberá administrarse durante dos días consecutivos en agua de bebida.

9. Instrucciones para una correcta administración

El volumen adecuado del medicamento veterinario debe añadirse diariamente al agua de bebida mientras se remueve. El uso de aguas ácidas puede provocar la precipitación de la sustancia activa a las dosis recomendadas. La solución debe prepararse diariamente.

Una vez finalizado el tratamiento, se debe limpiar adecuadamente el sistema de conducción de agua para evitar cualquier exposición a dosis subterapéuticas residuales, especialmente si pueden favorecer el desarrollo de resistencia.

10. Tiempos de espera

Carne:

Pollos: 14 días.

Pavos: 16 días.

No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.

No usar en las 6 semanas anteriores al comienzo del periodo de puesta.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta o en la caja después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.

Período de validez después de su dilución según las instrucciones: 24 horas.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

2467 ESP

Formatos:

Caja con 1 frasco de 100 ml.

Frasco de 1 litro.

Bidón de 5 litros.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

04/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la [Base de Datos de Medicamentos de la Unión](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Alemania

Tel: +34 518890402

PV.ESP@elancoah.com

Fabricante responsable de la liberación del lote:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel – Alemania

Representante local:

Elanco Spain, S.L.U.
Ed. América
Av. de Bruselas, 13
28108 Alcobendas (Madrid)
España

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

ETIQUETA-PROSPECTO

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO - ETIQUETA-PROSPECTO

Frasco de 1 litro, bidón de 5 litros

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

BAYCOX 25 mg/ml solución para administración en agua de bebida para pollos y pavos

2. COMPOSICIÓN

Cada ml contine:

Principios activos:

Toltrazurilo 25 mg

Solución transparente de incolora a marrón amarillento.

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 litro

5 litros

4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos de engorde, pollos reproductores, gallinas ponedoras y pavos.

5. INDICACIONES DE USO

Indicaciones de uso

Para el tratamiento de coccidiosis en pollos y pavos causada por infecciones por varias especies de *Eimeria*:

Pollos: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. mivati*.

Pavos: *Eimeria adenoides*, *E. meleagrimitis*.

6. CONTRAINDICACIONES

Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

7. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales

Una buena higiene puede reducir el riesgo de coccidiosis. Por lo tanto, se recomienda que, además del tratamiento, se corrijan las deficiencias en la cría. Los gallineros deben mantenerse limpios y secos.

Se recomienda tratar a todos los animales de un corral. Para obtener mejores resultados, el tratamiento debe iniciarse antes de que los signos clínicos de la enfermedad se hayan extendido por todo el grupo.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Al igual que con cualquier otro parasitocida, el uso frecuente y reiterado de antiprotozoarios de la misma clase puede llevar al desarrollo de resistencias.

Si existe resistencia, se debe considerar el uso de otro antiprotozoario de otra clase o mecanismo de acción. Este medicamento veterinario no debe utilizarse junto con aditivos alimentarios u otros medicamentos veterinarios que puedan interferir con la eficacia del medicamento, como coccidiostáticos e histomonostáticos.

El medicamento veterinario es una solución fuertemente alcalina y no debe administrarse sin diluir.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Las personas con hipersensibilidad conocida al toltrazurilo o al macrogol deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

El medicamento veterinario es una solución alcalina. Usar un equipo de protección individual consistente en guantes impermeables y gafas al manipular el medicamento veterinario.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y las mucosas y la ingestión. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con agua abundante. En caso de ingestión accidental o si aparecen síntomas tras la exposición, como irritación ocular o cutánea, consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

No comer, fumar o beber mientras se manipula el medicamento veterinario.

Lavar las manos después de su utilización.

Aves en periodo de puesta:

No procede, ver sección “tiempos de espera”.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

La combinación del medicamento veterinario con antibióticos puede provocar una reducción de la ingesta de agua en los pavos. Debe evitarse la administración concomitante de otras sustancias en el agua de bebida.

Sobredosificación:

Una dosis 3-5 veces superior a la dosis recomendada es bien tolerada. En caso de sobredosificación se observa un descenso del consumo espontáneo de agua.

Restricciones y condiciones especiales de uso:

Medicamento administrado bajo el control o supervisión del veterinario.

Incompatibilidades principales:

No existe información disponible sobre potenciales interacciones o incompatibilidades de este medicamento veterinario administrado por vía oral en agua de bebida que contenga productos biocidas, aditivos alimentarios u otras sustancias utilizadas en el agua de bebida.

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

8. ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

Acontecimientos adversos

Pollos de engorde, pollos reproductores, gallinas ponedoras y pavos: Ninguno conocido.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación: Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde o NOTIFICAVET: <https://si-naem.aemps.es/fvvet/NotificaVet>

9. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Posología para cada especie, modo y vías de administración

Administración en agua de bebida.

Para asegurar una dosificación correcta, el peso de los animales y el consumo diario de agua debe determinarse con la mayor exactitud posible.

La dosis recomendada es de 7 mg de toltrazurilo por kg de p.v. por día equivalente a 28 ml del medicamento por 100 kg p.v y día, durante 2 días consecutivos.

El medicamento veterinario debe administrarse de forma continua durante 24 horas al día durante 2 días consecutivos.

En caso de que se utilice un dispensador automático de dosis, el medicamento veterinario debe administrarse durante un periodo de 8 horas al día durante 2 días consecutivos.

El consumo de agua medicada depende de las condiciones fisiológicas y clínicas de los animales y de la época del año. Para asegurar una dosificación correcta, la concentración del medicamento en el agua se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario.

Según la dosis recomendada, el número y peso de los animales que deben recibir el tratamiento, se debe calcular la dosis diaria exacta de medicamentos aplicando la fórmula siguiente:

$$\frac{0.28 \text{ ml medicamento / kg de p.v. / día}}{\text{Consumo diario medio de agua por animal (l/animal)}} \times \frac{\text{p.v. medio de animales a tratar (kg)}}{\text{Consumo diario medio de agua por animal (l/animal)}} = \dots \text{ml de medicamento por litro de agua de bebida}$$

El agua medicada debe ser la única fuente de bebida durante todo el tratamiento. El agua de bebida debe ser renovada cada día.

Duración del tratamiento

Este medicamento veterinario deberá administrarse durante dos días consecutivos en agua de bebida.

10. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Instrucciones para una correcta administración

El volumen adecuado del medicamento veterinario debe añadirse diariamente al agua de bebida mientras se remueve. El uso de aguas ácidas puede provocar la precipitación de la sustancia activa a las dosis recomendadas.

La solución debe prepararse diariamente.

Una vez finalizado el tratamiento, se debe limpiar adecuadamente el sistema de conducción de agua para evitar cualquier exposición a dosis subterapéuticas residuales, especialmente si pueden favorecer el desarrollo de resistencia.

11. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera

Carne:

Pollos: 14 días.

Pavos: 16 días.

No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.

No usar en las 6 semanas anteriores al comienzo del periodo de puesta.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta-prospecto después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN

Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita.

14. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

15. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FORMATOS

2467 ESP

Formatos

1 litro

5 litros

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

16. FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DE LA ETIQUETA-PROSPECTO

Fecha de la última revisión de la etiqueta-prospecto

04/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la Base de Datos de Medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. DATOS DE CONTACTO

Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Alemania
Tel: +34 518890402
PV.ESP@elancoah.com

Fabricante responsable de la liberación del lote:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel – Alemania

Representante local:

Elanco Spain, S.L.U.
Ed. América
Av. de Bruselas, 13
28108 Alcobendas (Madrid)
España

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

18. INFORMACIÓN ADICIONAL

19. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

20. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mm/yyyy}

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.

Período de validez después de su dilución según las instrucciones: 24 horas.

Fecha límite de utilización:

21. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}