

PROSPECTO

CENFENDEL comprimidos

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:

CENAVISA S.L.
Camí Pedra Estela s/n
43205 Reus (ESPAÑA)

Fabricante responsable de la liberación del lote:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway (IRLANDA)

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

CENFENDEL comprimidos
Prazicuantel
Fenbendazol

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada comprimido contiene:

Sustancias activas:

Prazicuantel 50 mg
Fenbendazol 500 mg

Excipientes, c.s

Comprimido redondo, color crema, ranurado a cuartos.

4. INDICACIONES DE USO

En perros: Tratamiento de infestaciones mixtas por nematodos y cestodos de las siguientes especies:

NEMATODOS:

Ascaridos	<i>Toxocara canis</i> <i>Toxascaris leonina</i>
Ancilostomas	<i>Uncinaria stenocephala</i> (formas inmaduras, adultos) <i>Ancylostoma caninum</i> (formas inmaduras, adultos)
Tricúridos	<i>Trichuris vulpis</i> (adultos)

CESTODOS:

Echinococcus granulosus

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-12

Página 1 de 4

C/CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

Dipylidium caninum
Taenia spp. (Taenia pisiformis y Taenia hydatigena)

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.
No usar en cachorros de menos de 2 semanas de edad.
No usar en cachorros de menos de 0,5 kg.

6. REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía tarjeta verde

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc

7. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Cenfentel comprimidos se administra directamente o mezclado con un trozo de carne o de salchicha o junto con el alimento.

Administrar una dosis de 5 mg prazicuantel y 50 mg fenbendazol por kg peso corporal (equivalente a 1 comprimido por 10 kg), durante dos días consecutivos.

En el caso de cachorros, administrar una dosis de 2,5-5 mg prazicuantel y 25-50 mg fenbendazol por kg peso corporal (equivalente a 1/2 comprimido por cada 2,5-5 kg de peso), durante dos días consecutivos.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Para asegurar una correcta dosificación, el peso debe ser determinado tan exactamente como sea posible.

10. TIEMPO DE ESPERA

No procede.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta o en la caja después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Periodo de validez después de abierto el envase: uso inmediato.
Desechar cualquier comprimido fraccionado no utilizado.

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales para cada especie de destino:

La resistencia de los parásitos a una clase particular de antihelmínticos puede desarrollarse como consecuencia de un uso frecuente, repetido de un antihelmíntico de esa clase.

Las pulgas sirven como huéspedes intermedios para uno de los cestodos comunes *Dipylidium caninum*.

Las infestaciones por cestodos pueden reaparecer a menos que los huéspedes intermedios (pulgas) estén bajo control.

El prazicuantel es efectivo frente al cestodo *Echinococcus granulosus* en perros. Como medida de precaución se recomienda que todos los perros que entren en instalaciones de cuarentena sean tratados con prazicuantel.

Precauciones especiales para su uso en animales:

Para asegurar una correcta dosificación, el peso debe ser determinado tan exactamente como sea posible.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Las personas con hipersensibilidad conocida a prazicuantel o fenbendazol deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Lavarse las manos después de manipular los comprimidos.

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto o la etiqueta.

No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento veterinario.

Gestación o lactancia:

En perras gestantes utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Su uso es seguro en perras lactantes.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

Ambos, fenbendazol y prazicuantel, son muy bien tolerados. En casos de sobredosis, pueden ocurrir vómitos ocasionales y diarrea transitoria.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico como debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

04 de julio de 2017

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Formatos:

Caja con 1 frasco de: 20, 24, 30, 50, 60, 96, 100, 120 y 200 comprimidos

Caja con tiras y blísteres de aluminio de: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 48, 50, 60, 100, 120, 200 y 400 comprimidos

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Reg. Nº: 2530 ESP