PROSPECTO PARA:

TOXIPRA CONEJOS
Suspensión inyectable

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante:
Laboratorios Hipra, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona) España
Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TOXIPRA CONEJOS
Suspensión inyectable

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada dosis (0,5 ml) contiene:

Sustancia activas:
Toxoide β de *Clostridium perfringens* tipo B y C ..... ≥ 10 UI*
Toxoide ε de *Clostridium perfringens* tipo B y D ..... ≥ 5 UI*
*UI: Unidades Internacionales de antitoxina por ml de suero

Adyuvantes:
Hidróxido de aluminio (Al^{3+}) …….. 0,00246 mg

Excipiente: (Conservante):
Tiomersal …… 0,05 mg

4. INDICACIÓNES DE USO

Para la inmunización activa de conejos para prevenir la infección frente a enfermedades (Enterotoxemia) causadas por *Cl. Perfringens* (Tipos B, C y D).
El inicio de la inmunidad es a los 12 días después de la primera administración y su duración de 4 meses después de la primera vacunación.

5. CONTRAINDICACIONES

Ninguna.

6. REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

7. ESPECIES DE DESTINO

Conejos (reproductores y conejos de engorde).

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Dosis: 0,5 ml / animal.
Vía subcutánea en la región de la espalda o nuca.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Programa vacunal:

Conejos reproductores:
Primovacunación: Administrar una dosis a los dos meses de vida, y una segunda dosis 21 días después.
Revacunación: Administrar una dosis cada 4 ó 6 meses, según la gravedad del problema, siendo aconsejable vacunar cada primavera y otoño.

Conejos de engorde: Administrar una dosis única de 0,5 ml/conejo, preferentemente al destete (a los 30 días de edad).

10. TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Conservar y transportar refrigerado (entre 2º C y 8º C). No congelar. Proteger de la luz.
No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta después de CAD o EXP

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Advertencias especiales para cada especie de destino:
Usar material estéril para su administración.
Agitar antes de usar.
Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente de unos +15 a + 25 º C.
Vacunar únicamente animales sanos.

Precauciones especiales para su uso en animales:
No procede

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:
En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta:
Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
No existe información disponible sobre la seguridad ni la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):
Tras la inoculación de una sobredosis (2 dosis de vacuna) no se han descrito reacciones adversas.

Incompatibilidades:
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

14/11/2013

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Formatos:
Caja con 10 viales de 40 dosis (20 ml)
Caja con 1 vial de 200 dosis (100 ml)

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Condiciones de dispensación: **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**
Condiciones de administración: **Administración bajo control o supervisión del veterinario**