

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

Euthanimal 200 mg/ml, solución inyectable

2. Composición

Cada ml contiene

Principio activo:

Pentobarbital sódico	200 mg (equivalentes a 182 mg de pentobarbital)
----------------------	---

Excipientes:

Alcohol bencílico (E1519)	20,0 mg
Etanol	80,0 mg
Ponceau R4 (E 124)	0,02 mg

Solución transparente de color rojo.

3. Especies de destino

Bovino, caballos, porcino, caprino, ovino, perros, gatos, conejos, cobayas, ratones, ratas, hámsteres, pollos, palomas, patos, pequeñas aves ornamentales, serpientes, tortugas, lagartos y ranas.

4. Indicaciones de uso

Eutanasia.

5. Contraindicaciones

No utilizar como anestésico.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

La inyección intravenosa de pentobarbital induce excitación en varias especies de animales, por lo que debe administrarse una sedación adecuada si el veterinario lo considera necesario. Deben adoptarse medidas para evitar la administración perivascular (por ejemplo, utilizando un catéter intravenoso). La muerte puede retrasarse si la inyección se administra perivascular, intraperitoneal/intracelómica o en órganos o tejidos con baja capacidad de absorción. Los barbitúricos pueden ser irritantes en la administración perivascular o por otras vías distintas a la intravenosa.

Compruebe con regularidad, hasta unos 10 minutos después de la administración, si aparecen signos de vida (respiración, ritmo cardíaco, reflejo corneal). En ensayos clínicos se ha establecido que esto puede ocurrir. Si aparecen tales signos, se aconseja repetir la administración usando entre 0,5 y 1 veces la dosis prescrita.

Evítese el uso en animales que pesen más de 120 kg, debido al elevado volumen de inyección necesario y a la dificultad de lograr una administración rápida.

Para reducir el riesgo de inducir excitación, la eutanasia debe practicarse en un lugar tranquilo. En porcino, se ha demostrado que existe una correlación directa entre la restricción y el nivel de excitación y agitación. Por lo tanto, la inyección en cerdos debe realizarse con la menor restricción necesaria.

De forma especial en el caso de caballos y bovino, el veterinario debe considerar la premedicación con un sedante apropiado para inducir una sedación profunda antes de la eutanasia; además, se recomienda disponer de un método de eutanasia alternativo por si fuese necesario.

Si se utiliza la vía intracelómica en aves, se debe evitar la inyección en los sacos aéreos. La vía intracelómica no se recomienda en quelonios, ya que el tiempo hasta la muerte puede prolongarse. En reptiles y anfibios, deben adoptarse medidas apropiadas (p. ej. pithing) para asegurar que la eutanasia sea completa, ya que sus cerebros pueden sobrevivir a una anoxia prolongada y, de lo contrario, podría producirse la recuperación tras el metabolismo del pentobarbital. Cuando se realice la eutanasia en poiquilotermos, el animal debe mantenerse a su temperatura óptima preferida; de lo contrario, la eficacia puede ser poco fiable.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Los cadáveres y los productos comestibles de los animales tratados con este medicamento veterinario no deben entrar nunca en la cadena alimentaria (ver sección “Tiempos de espera”) y su eliminación deberá hacerse según la legislación nacional aplicable.

Con el fin de evitar el riesgo de intoxicación secundaria, nunca se deben suministrar a otros animales los cadáveres (o partes) de animales tratados con este medicamento veterinario (ver sección “Tiempos de espera”).

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales:

El pentobarbital es un hipnótico y sedante potente y, por tanto, potencialmente tóxico para el ser humano. El pentobarbital causa sedación, inducción del sueño y depresión respiratoria. Puede absorberse sistémicamente a través de la piel y por ingestión.

Además, este medicamento veterinario puede ser irritante para los ojos y puede causar irritación de la piel.

Evitar el contacto directo con la piel y los ojos, incluyendo el contacto mano-a-ojo y mano-a-boca.

Se debe prestar especial atención para evitar la autoinyección y la inyección accidental a un segundo profesional cuando se administre el producto veterinario. Cargar únicamente este medicamento veterinario en una jeringa sin aguja para evitar la inyección accidental. Usar guantes de protección.

En caso de derrame sobre la piel o los ojos accidental, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental, lavar la boca inmediatamente.

En caso de contacto importante con piel u ojos, o en caso de ingestión o autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente, informe de la posible intoxicación por barbitúricos y muéstrelle el prospecto o la etiqueta. NO CONDUZCA, ya que puede producir sedación.

No se pueden excluir efectos embriotóxicos. Manipular el medicamento veterinario con máximo cuidado, especialmente las mujeres en edad fértil.

Este medicamento veterinario puede causar reacciones de hipersensibilidad debido a la presencia de pentobarbital o alcohol bencílico. Las personas con hipersensibilidad conocida al pentobarbital deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Este medicamento veterinario es inflamable; mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar.

Este medicamento sólo puede ser administrado por veterinarios y debe utilizarse únicamente en presencia de otro profesional que pueda ayudar en caso de exposición accidental. Instruir al profesional si no es un profesional médico acerca de los riesgos de este medicamento veterinario.

El colapso se produce en los 10 segundos tras la administración de este medicamento veterinario. En caso de que el animal esté de pie en el momento de la administración, el veterinario que administre el medicamento y cualquier otra persona situada cerca, deben tener cuidado y mantenerse a cierta distancia del animal para evitar lesiones.

Información para el profesional de la salud en caso de exposición:

Las medidas de emergencia deben dirigirse al mantenimiento de la respiración y la función cardíaca. En casos de intoxicación grave, puede ser necesario acelerar la eliminación del barbitúrico absorbido. No dejar al paciente sin vigilancia.

La concentración de pentobarbital en el medicamento veterinario es tal, que la inyección o ingestión accidentales de cantidades tan pequeñas como 1 ml en humanos adultos, pueden tener efectos graves sobre el SNC. Una dosis de pentobarbital sódico de 1 g (equivalente a 5 ml del medicamento veterinario) ha demostrado ser mortal en humanos. El tratamiento de soporte debe incluir tratamiento intensivo apropiado y mantenimiento de la respiración.

Gestación:

No hay disponible información específica.

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Los depresores del SNC (narcóticos, fenotiazinas, antihistamínicos, etc.) pueden incrementar el efecto del pentobarbital.

Sobredosificación:

En caso de administración accidental a un animal no destinado a la eutanasia, están indicadas medidas como respiración artificial, administración de oxígeno y administración de analépticos.

Debido a la actividad de este medicamento veterinario, se desaconseja doblar la dosis si se administra por vía intravenosa, ya que no resultará en una eutanasia más rápida o mejor.

Restricciones y condiciones especiales de uso:

Medicamento administrado exclusivamente por el veterinario.

Incompatibilidades principales:

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

7. Acontecimientos adversos

Todas las especies de destino:

Frecuentes (1 a 10 animales por cada 100 animales tratados):	Vocalización Fasciculaciones musculares
Raros: (1 a 10 animales por cada 10 000 animales tratados):	Excitación Movimiento involuntario (pata) Incontinencia fecal

	Incontinencia urinaria
Muy raros: (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):	Convulsiones Contracción del diafragma Vómitos Respiración agónica (jadeo) ¹
Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):	Dolor inmediato tras la inyección ²

¹ Una o varias boqueadas después de la parada cardíaca.

² Los barbitúricos pueden ser irritantes cuando se administran por vías distintas a la intravenosa.

Bovino:

Raros (1 a 10 animales por cada 10 000 animales tratados):	Respiración agónica (jadeo) ¹
---	--

¹ sobre todo como consecuencia de la infradosificación.

Aves:

Muy frecuentes (>1 animal por cada 10 animales tratados):	Espasmo tónico muscular Erizamiento de las plumas
--	--

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización o a su representante local utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde

http://bit.ly/tarjeta_verde

o

NOTIFICAVET

<https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Vía intravenosa.

Vía intraperitoneal.

Vía intracardiaca.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta.

El medicamento veterinario se administra preferiblemente mediante una única inyección intravenosa rápida. Para animales más grandes, se recomienda el uso de un catéter intravenoso previamente insertado.

Cuando se administra el medicamento veterinario por una vía distinta a la intravenosa, los animales deben estar fuertemente sedados o inconscientes y no deben mostrar ninguna reacción a estímulos dolorosos, excepto en el caso de la administración intraperitoneal en ratas y ratones. La inyección intracardiaca solo es aceptable después de una sedación profunda o anestesia previas.

El uso de pentobarbital por vía intraperitoneal en ratas y ratones no sedados, solo es aceptable cuando se han tomado medidas para evitar una inyección incorrecta, incluyendo el uso de agujas de tamaño adecuado (p. ej. 26G para ratones).

Para las vías de administración intraperitoneal o intracelómica, se recomiendan dosis más altas cuando sea posible.

Si el paro cardíaco no se establece después de 2 minutos, se debe administrar una segunda dosis, preferiblemente mediante inyección intravenosa rápida o, si procede, mediante inyección intracardiaca.

Debido a que el vial no puede ser perforado más de 20 veces, el usuario debe elegir el tamaño del vial más adecuado.

La siguiente tabla contiene la información de la dosis para cada especie animal:

Especie de destino	Vía de administración	Dosis
Bovino, caballos, porcino, caprino, ovino, gatos, perros	Intravenosa	La dosis recomendada es de 100 mg/kg peso (equivalentes a 0,5 ml/kg).
Ratones	Intravenosa Intraperitoneal Intracardiaca	La dosis mínima es de 250 mg/kg p.c. (equivalentes a 1,25 ml/kg); se pueden utilizar hasta 1600 mg/kg p.c.
Ratas	Intravenosa Intraperitoneal Intracardiaca	La dosis mínima es de 200 mg/kg p.c. (equivalentes a 1 ml/kg); se pueden utilizar hasta 800 mg/kg p.c.
Conejos, hámsteres, cobayas	Intravenosa Intraperitoneal Intracardiaca	La dosis recomendada es de 200 mg/kg peso (equivalentes a 1 ml/kg).
Pollos, palomas, patos	Intravenosa Intracelómica Intracardiaca	La dosis recomendada es de 200 mg/kg peso (equivalentes a 1 ml/kg).
Pequeñas aves ornamentales	Intracelómica	La dosis recomendada es de 1300 mg/kg (equivalentes a 6,5 ml/kg).
Serpientes	(Intravenosa) Intracelómica Intracardiaca	La dosis recomendada es de 200 mg/kg p.c. (equivalentes a 1 ml/kg). La administración intracelómica o intracardiaca debe ser la primera opción.
Tortugas	Intravenosa Intracelómica Intracardiaca	La dosis mínima es de 200 mg/kg p.c. (equivalentes a 1 ml/kg); para la administración intracelómica se pueden utilizar dosis de hasta 1100 mg/kg p.c.
Lagartos	Intravenosa Intracelómica Intracardiaca	La dosis mínima es de 400 mg/kg p.c. (equivalentes a 2 ml/kg); se pueden utilizar dosis de hasta 800 mg/kg p.c.
Ranas	(Intravenosa) Intracelómica Intracardiaca	La dosis mínima es de 200 mg/kg p.c. (equivalentes a 1 ml/kg); se pueden utilizar dosis de hasta 1100 mg/kg p.c. La administración intracelómica o intracardiaca debe ser la primera opción.

9. Instrucciones para una correcta administración

10. Tiempos de espera

No procede.

Se deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que los cadáveres y productos comestibles de los animales tratados con este medicamento veterinario no entran en la cadena alimentaria, y no se utilizan para el consumo humano. Otros animales no deben nunca comer (partes de) los cadáveres de estos animales, ya que podrían estar expuestos a una dosis letal de pentobarbital.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

En el momento en que se perfora el vial por primera vez, anotar en el espacio de la etiqueta reservado para ello la fecha en la que debe eliminarse el medicamento veterinario restante.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Este medicamento veterinario es peligroso para humanos y animales.

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables al medicamento veterinario en cuestión. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

2951 ESP

1 vial de 100 ml o 1 vial de 250 ml de vidrio tipo II para inyección, con tapón de goma de bromobutilo y cápsula de cierre de aluminio, en una caja de cartón.

12 viales de 100 ml o 6 viales de 250 ml de vidrio tipo II para inyección, con tapón de goma de bromobutilo y cápsula de cierre de aluminio, en una caja de poliestireno.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

11/2025

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:

Alfasan Nederland B.V.

Kuipersweg 9

3449 JA Woerden

Países Bajos

Representante local y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Labiana Life Sciences, S.A.

Calle Venus 26,

08228 Terrassa (Barcelona)

España.

Tel: +34 93 736 97 00

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

17. Información adicional