

PROSPECTO:

Canitenol plus 50 mg/144 mg/150 mg comprimidos para perros.

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:

Laboratorios Syva S.A.U.
Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57
24010 León (España)

Fabricante responsable de la liberación del lote:

GENERA Inc.
Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica
10436 Rakov Potok (Croacia)

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Canitenol plus 50 mg/144 mg/150 mg comprimidos para perros.
Prazicuantel, embonato de pirantel, febantel

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada comprimido contiene:

Prazicuantel	50 mg
Pirantel	50 mg
(equivalente a 144 mg de embonato de pirantel)	
Febantel	150 mg

Comprimido amarillo, redondo, plano y ranurado en una cara permitiendo la división en cuartos iguales.

4. INDICACIONES DE USO

En perros: tratamiento de infecciones mixtas por nematodos o cestodos de las siguientes especies:

Nematodos:

Ascáridos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (adultos y formas inmaduras avanzadas).

Anquilostomas: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultos).

Tricuros: *Trichuris vulpis* (adultos).

Cestodos:

Tenias: *Echinococcus* spp (*Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*), *Taenia* spp. (*Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaeformis*), *Dipylidium caninum* (adultos y formas inmaduras).

CORREO ELECTRÓNICO

smuwaem@aemps.es

F-DMV-01-12

Página 1 de 4

C/CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

5. CONTRAINDICACIONES

No usar simultáneamente con compuestos de piperazina.
No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

6. REACCIONES ADVERSAS

Ninguna conocida.

Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Perros

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Para asegurar la administración de la dosis correcta, se determinará el peso corporal de la manera más precisa posible.

Las dosis recomendadas son: 1 comprimido por 10 kg de peso corporal en dosis única (5 mg prazicuantel, 15 mg febantel y 14.4 mg de embonato de pirantel, por kg de peso corporal).

Cachorros y perros pequeños

0,5- 2 kg peso	1/4 comprimido
2-5 kg peso	1/2 comprimido
5-10 kg peso	1 comprimido

Perros medianos

10-20 kg peso	2 comprimidos
20-30 kg peso	3 comprimidos

Perros grandes

30-40 kg peso	4 comprimidos
---------------	---------------

En caso de riesgo por reinfestación, se debe consultar al veterinario respecto a la necesidad y la frecuencia de repetir la administración.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

El medicamento veterinario puede ser directamente administrado al perro u oculto en la comida (en una pieza de carne, queso, etc).

Se recomienda tratar a los animales antes de comer y no es necesario ayuno antes o después del tratamiento.

10. TIEMPO DE ESPERA

No procede.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja después de CAD/EXP {mes/año}

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años
Período de validez de los comprimidos partidos: Use inmediatamente.

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales para cada especie de destino:

Las pulgas actúan como huésped intermedio para un tipo común de tenia - *Dipylidium caninum*. La infestación por tenias se repetirá con seguridad, salvo que se controlen los huéspedes intermedios tales como pulgas, ratones, etc.

El uso frecuente y repetido de los antihelmínticos de una misma clase, puede desarrollar resistencia parasitaria a aquella clase de antihelmínticos.

Las tenias son improbables en cachorros menores de 6 meses de edad.

Precauciones especiales para su uso en animales:

Los comprimidos parcialmente usados deben ser desechados.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si se produce contacto, lavar el medicamento veterinario de la piel o los ojos inmediatamente con agua.

En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediatamente y muéstrela el prospecto o la etiqueta al facultativo.

Lávese las manos después de su uso.

Gestación:

Se han reportado efectos teratogénicos atribuidos a altas dosis de febantel en ovejas y ratas. No se han realizado estudios en perros durante la primera fase de la gestación. El uso del medicamento veterinario durante la gestación debe realizarse de acuerdo con una evaluación riesgo-beneficio por el veterinario responsable. Se recomienda no usar el medicamento veterinario en perras durante las primeras 4 semanas de gestación. No exceder la dosis recomendada para el tratamiento en perras gestantes.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

El uso concomitante con otros compuestos colinérgicos puede producir toxicidad. La administración simultánea de compuestos que inhiben la acetilcolinesterasa (organofosforados) puede aumentar el efecto sistémico de pirantel. No usar simultáneamente con compuestos de piperazina, ya que puede antagonizar los efectos antihelmínticos de pirantel.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

La combinación de prazicuantel, embonato de pirantel y febantel es bien tolerada por los perros. En los estudios de seguridad, una dosis única de 5 veces o más a la dosis recomendado, dio lugar a vómitos ocasionales.

Incompatibilidades:

No procede.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Octubre 2019

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Formatos:

Caja con 2 tiras x 10 comprimidos

Caja con 10 tiras x 10 comprimidos

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.