

PROSPECTO:

Bob Martin Clear Fipronilo 67 mg solución spot on para Perros Pequeños
Bob Martin Clear Fipronilo 134 mg solución spot on para Perros Medianos
Bob Martin Clear Fipronilo 268 mg solución spot on para Perros Grandes
Bob Martin Clear Fipronilo 402 mg solución spot on para Perros Muy Grandes

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización

Pets Choice Healthcare Ltd
38 Main Street
Swords
Co. Dublin
Irlanda

Fabricante responsable de la liberación del lote:

Baggerman Farmanet N.V.
Barrierweg 3 G
Eindhoven
5622CL
Países Bajos

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Bob Martin Clear Fipronilo 67 mg solución spot on para Perros Pequeños
Bob Martin Clear Fipronilo 134 mg solución spot on para Perros Medianos
Bob Martin Clear Fipronilo 268 mg solución spot on para Perros Grandes
Bob Martin Clear Fipronilo 402 mg solución spot on para Perros Muy Grandes

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Solución amarillenta clara transparente.

Medicamento veterinario	Tamaño del perro	Tratamiento	Contenido		
			Sustancia activa	Excipiente (otros componentes)	
			Fipronilo	Butilhidroxianisol (E320)	Butilhidroxitolueno (E321)
Bob Martin Clear Fipronilo 67 mg solución spot on para Perros Pequeños	2-10 kg	Aplicar una pipeta de 0,67 ml	67 mg	0,134 mg	0,067 mg
Bob Martin Clear Fipronilo 134 mg solución spot on para Perros Medianos	10-20 kg	Aplicar una pipeta de 1,34 ml	134 mg	0,268 mg	0,134 mg
Bob Martin Clear Fipronilo 268 mg solución spot on para Perros Grandes	20-40 kg	Aplicar una pipeta de 2,68 ml	268 mg	0,536 mg	0,268 mg
Bob Martin Clear Fipronilo 402 mg solución spot on para Perros Muy Grandes	40-60 kg	Aplicar una pipeta de 4,02 ml	402 mg	0,804 mg	0,402 mg

4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Bob Martin Clear Fipronilo solución spot on para Perros es para matar pulgas y garrapatas. Aplicado en la base de la nuca y entre los hombros cada tratamiento proporciona protección contra pulgas durante un máximo de 8 semanas y protege de las garrapatas durante un máximo de 4 semanas.

Mata las pulgas y su eficacia está clínicamente probada en 48 horas.

Este medicamento veterinario no impide que las pulgas ataquen a los perros, pero las mata en 48 horas.

Bob Martin Clear Fipronilo solución spot on se puede aplicar a perros de más de 2 meses y es apto para usar en viviendas con perros y gatos.

5. CONTRAINDICACIONES

No aplicar este medicamento veterinario a cachorros de menos de 2 meses y/o menos de 2 kg. No usar si sabe que su perro padece una hipersensibilidad conocida al fipronilo o a cualquier otro componente.

No usar junto con otros productos antipulgas aplicados directamente a la piel del perro.



¡No aplicar a conejos, ya que podría provocarles la muerte!

No aplicar a zonas de la piel del perro que estén dañadas (arañadas, enrojecidas, rotas).
No usar en animales enfermos o convalecientes.

6. REACCIONES ADVERSAS

El sabor extremadamente amargo del medicamento veterinario podría hacer salivar (babeo) al perro si este u otra mascota lamiera la piel justo después de la aplicación. El babeo suele desaparecer en poco tiempo.

En ocasiones raras pueden producirse reacciones cutáneas como caída del pelo, enrojecimiento, picor y lesiones cutáneas, bien en el lugar de la aplicación o bien más generalizadas. Se han notificado excepcionalmente episodios de salivación excesiva y signos nerviosos, como depresión, hipersensibilidad, vómitos o dificultades respiratorias.

7. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Usar una pipeta por perro, aplicada en la piel siguiendo las instrucciones.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Sólo para uso externo.

Para proteger su salud y la de su perro, lea detenidamente este prospecto antes de aplicar el medicamento veterinario a su perro.

¿Cómo se usa Bob Martin Clear Fipronilo solución spot on?

Su perro debe tener como mínimo 2 meses de edad Y pesar lo estipulado en la parte frontal del envase.

Pese al cachorro antes y asegúrese de que se utiliza el medicamento veterinario correcto en función del peso del cachorro.



1. Bob Martin Clear Fipronilo solución spot on para Perros debe aplicarse en 2 puntos: en la base de la nuca y entre los hombros del animal. Si el perro lleva collar, quíteselo para aplicar sin restricciones.
2. Sujetar la pipeta boca arriba y romper la parte superior de la tapa para abrir la pipeta.
3. Separar el pelo del perro hasta que se vea la piel. Colocar la punta de la pipeta directamente sobre la piel y apretar suavemente. Aplicar aproximadamente la mitad de la pipeta en la base de la nuca y la otra mitad entre los hombros del perro. Apretar la pipeta varias veces para vaciarla por completo. No aplicar en el pelo y no frotar la piel, ya que ello reduciría la eficacia del medicamento veterinario. No permitir que los animales se laman entre sí después del tratamiento.

Evitar el humedecimiento excesivo del pelaje; en ocasiones se puede observar pegajosidad de cristales, pero normalmente este fenómeno desaparece en un plazo de 48 horas.

Evitar bañar o enjabonar al perro con frecuencia.

¿Sólo necesito Bob Martin Clear Fipronilo solución spot on?

Para proteger a su mascota y su hogar de pulgas, es necesario tratar regularmente a todos los perros y gatos que convivan con usted, así como aspirar con frecuencia la cama y las zonas de descanso de los animales. Si se produce una infestación grave, también puede ser necesario tratar la casa con un producto antipulgas doméstico aprobado.

¿Con qué frecuencia debo utilizar Bob Martin Clear Fipronilo solución spot on?

Este medicamento veterinario ofrece protección frente a pulgas durante 8 semanas y frente a garrapatas durante 4 semanas. El intervalo mínimo entre tratamientos es de 4 semanas.

10. TIEMPO DE ESPERA

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar a temperatura inferior a 25°C, en lugar seco y en el envase original.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta después de {CAD}. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Precauciones especiales para su uso en animales:

No permitir que las mascotas tratadas se laman entre sí.

Aplicar el medicamento veterinario siguiendo las instrucciones para que su mascota no pueda lamerlo.

Asegurarse de que el líquido de la pipeta no entre en contacto con los ojos o la boca del animal. Si entra en contacto, lavar rápidamente con agua abundante. Si es necesario, solicitar consejo veterinario.

Gestación y lactancia:

Su uso no está recomendado en perros en períodos de gestación y lactancia. Consultar a su veterinario.

Si aparecen signos de enfermedad o éstos persisten, consultar a un veterinario.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

La seguridad de este medicamento veterinario no ha sido investigada en estudios con sobredosis o dosis repetidas debido al perfil de seguridad bien conocido del principio activo y de otros componentes.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

No se debe tocar ni jugar con los animales tratados hasta que se haya secado el lugar de aplicación. Por ello, se recomienda aplicar por la noche. Los perros tratados no deben dormir con sus dueños, especialmente si son niños.

Este medicamento veterinario puede provocar irritación en los ojos y las membranas mucosas. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la boca. Si se produce contacto con la piel, lavar rápidamente con agua abundante y jabón. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia abundante. Si la irritación ocular persiste, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o el envase.

No comer, beber ni fumar mientras se utilice este medicamento veterinario.

Lávese bien las manos después de usarlo.

Las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo o a cualquier otro principio activo deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Únicamente para uso veterinario.

Otras precauciones

El fipronilo puede tener un efecto adverso para los organismos acuáticos. No se debe permitir a los perros bañarse en corrientes de agua durante 2 días después de la aplicación.

Este medicamento veterinario puede dejar marcas en algunos materiales, como cuero, tejidos, plásticos y superficies acabadas. Dejar secar el lugar de aplicación antes de que el animal entre en contacto con estos materiales.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

El fipronilo puede tener un efecto adverso para los organismos acuáticos. No contaminar estanques, arroyos o acequias con el medicamento veterinario o con el envase vacío.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Enero 2022

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Blísteres o cajas de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 pipetas.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.