PROSPECTO:

Alvebuton 100 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino, caballos, ovino, caprino

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:
V.M.D.n.v., Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Bélgica

Fabricante responsable de la liberación del lote:
V.M.D.n.v., Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk – Bélgica
O:
Laboratoires Biové, 3 Rue de Lorraine, 62510 Arques - Francia

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Alvebuton 100 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino, caballos, ovino, caprino
Menbutona

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada ml contiene:

Sustancia activa:
Menbutona ..... 100,00 mg
Excipientes:
Clorocresol ..... 2,00 mg
Metabisulfito sódico (E 223)..... 2,00 mg

Solución transparente, color amarillo claro a amarillo

4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Bovino, porcino, caballos, ovino, caprino:
Estimulación de la actividad hepatodigestiva en caso de trastornos digestivos e insuficiencia hepática.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar en animales con alteraciones cardíacas o durante las últimas etapas de la gestación.
Consulte la sección “Gestación y lactancia”.

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

6. REACCIONES ADVERSAS

Después de la administración intravenosa puede aparecer hipersalivación, lagrimeo, temblores, micción y defecación espontáneas.
Después de la inyección intramuscular se pueden producir reacciones en el punto de administración
(edema, hemorragia, necrosis).
En ocasiones también se ha observado agitación y respiración acelerada. En raras ocasiones puede producirse posición decúbito temporal, especialmente en bovino y después de una administración intravenosa rápida.
La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:
- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 animales tratados presenta reacciones adversas)
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados)
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000 animales tratados)
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados)
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo casos aislados)

Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía tarjeta verde

(https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc)

7. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, caballos, ovino, caprino.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Bovino (terneros), ovino, caprino y porcino: inyección intramuscular o intravenosa.
Bovino, : inyección intravenosa.
Caballos: vía intravenosa lenta.

Terneros (hasta 6 meses de edad), ovino, caprino y porcino:
10 mg de menbutona por kg de peso vivo por vía IM o IV
equivalente a 1 ml de solución inyectable por cada 10 kg de peso vivo.

Bovino adulto:
5 - 7,5 mg de menbutona por kg de peso vivo IV
equivalente a 1 ml de solución inyectable por cada 15 - 20 kg de peso vivo.

Caballos:
2,5 - 5 mg de menbutona por kg de peso vivo IV
equivalente a 1 ml de solución inyectable por cada 20 - 40 kg de peso vivo.

La administración se puede repetir una vez después de 24 horas en caso necesario.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Ninguna.

10. TIEMPO(S) DE ESPERA

Bovino, porcino, caballos, ovino, caprino:	Carne:	cero días
Bovino, caballos, ovino, caprino:	Leche:	cero días

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz. No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta y la caja después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.
Período de validez después de abierto el envase: 28 días

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Precauciones especiales para su uso en animales
En caballos, utilizar sólo la vía intravenosa lenta.
La administración intravenosa debe hacerse lentamente (en un tiempo no inferior a 1 minuto) para evitar los efectos secundarios descritos en la sección "Reacciones adversas".

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales
En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. La autoinyección accidental puede provocar irritación.
Las personas con hipersensibilidad conocida a la menbutona deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Gestación y lactancia:

No utilizar este medicamento durante el último tercio de la gestación. El medicamento se puede usar durante la lactancia

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Ninguna conocida.

Incompatibilidades:
No administrar conjuntamente con productos que contengan sales de calcio, penicilina procaína o vitaminas B.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Noviembre 2021

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Vial multidosis transparente tipo I de 100 ml, cerrado con tapón de goma de bromobutilo y cápsula de aluminio.

Formatos:
Caja con 1 vial de 100 ml de solución inyectable.
Caja con 10 viales de 100 ml de solución inyectable.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario (en el caso de administración intravenosa) o bajo su supervisión y control