

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

Fiprotec Spray 2,5 mg/ml solución para pulverización cutánea para gatos y perros

2. Composición

Cada ml contiene: 2,5 mg de fipronilo.

Líquido transparente e incoloro.

3. Especies de destino

Gatos y perros.

4. Indicaciones de uso

Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Ixodes* spp., incluyendo *Ixodes ricinus*), en gatos y perros.

Tratamiento de las infestaciones por piojos picadores en perros (*Trichodectes canis*) y gatos (*Felicola subrostratus*).

La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas, persiste hasta 2 meses en gatos y hasta 3 meses en perros, según la carga medioambiental.

El medicamento veterinario presenta una eficacia acaricida persistente de hasta un mes en el caso de las garrapatas, dependiendo de la carga medioambiental.

5. Contraindicaciones

No usar en animales enfermos o convalecientes.

No usar en conejos, ya que pueden producirse reacciones adversas e incluso la muerte.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

Para lograr la máxima eficacia, se recomienda no bañar a los animales ni utilizar champú los dos días previos al tratamiento, ni los dos posteriores al mismo. Bañar o aplicar champú hasta en cuatro ocasiones durante un periodo de dos meses, no ejerce un efecto significativo sobre la eficacia residual del medicamento veterinario. Se recomienda aplicar el tratamiento una vez al mes si se lava el pelo del animal con champú con mayor frecuencia.

Tener en cuenta la posibilidad de que otros animales del mismo hogar puedan ser fuente de reinfección por pulgas, garrapatas y piojos picadores, y tratarlos si es necesario con un producto adecuado.

Las pulgas de las mascotas a menudo infestan la cesta, el lecho y las zonas de descanso habitual de los animales, como alfombras y mobiliario blando, debiendo tratarse en casos de infestación masiva y al inicio de las medidas de control, utilizando un insecticida adecuado y aspirando con regularidad.

Puede que alguna garrapata aislada se enganche a los animales, no pudiendo descartarse por completo la transmisión de enfermedades infecciosas en caso de que las condiciones sean desfavorables.

El medicamento veterinario no está destinado al tratamiento directo del medio ambiente.

Dado el volumen rociado por la bomba pulverizadora (0,5 ml/descarga), el medicamento veterinario es muy adecuado para su uso en gatos y perros de hasta 5-10 kg de peso corporal, dependiendo de la longitud del pelo (véase también el apartado “Posología para cada especie, modo y vías de administración”), pero no resulta adecuado para perros medianos y grandes.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Es importante asegurar que los animales no se laman unos a otros tras el tratamiento.

Evitar el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto con los ojos accidental, lavar inmediatamente con abundante agua.

No pulverizar directamente en zonas de piel con lesiones.

Permitir que los animales tratados se sequen en una habitación bien ventilada (ver sección “Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales”).

No encerrar a los animales en un espacio cerrado ni en un transportín hasta que el pelaje esté completamente seco.

No se recomienda usar este medicamento veterinario en especies diferentes de gatos y perros, debido a la falta de información específica sobre tolerancia y eficacia.

Los cachorros y gatitos pueden tratarse con seguridad a partir de los dos días de edad.

Los animales tratados deben mantenerse lejos de fuegos y de otras fuentes de calor, así como de superficies que puedan verse afectadas por el alcohol presente en el spray, durante mínimo 30 minutos tras la pulverización y hasta que el pelaje esté totalmente seco. No pulverizar el medicamento cerca de una llama o de cualquier material incandescente.

Para uso cutáneo exclusivamente.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Este medicamento puede ocasionar irritación ocular y de las membranas mucosas. Evitar el contacto del medicamento con ojos y boca.

Las personas con asma o hipersensibilidad conocida (alergia) a los insecticidas o al alcohol, deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Evitar el contacto del contenido con los dedos. Si ocurriera, lávese las manos con agua y jabón. En caso de irritación, consulte con un médico.

En caso de exposición ocular accidental, lavar los ojos minuciosamente con agua corriente.

Los animales tratados no deben tocarse, ni se debe permitir a los niños jugar con ellos, hasta que el pelaje esté seco. Por tanto, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino al atardecer, y que los animales recién tratados no duerman con sus propietarios, especialmente con los niños.

Pulverice a los animales al aire libre, o en una habitación bien ventilada.

Evite respirar el spray. No fume, beba ni coma durante la aplicación.

Usar un equipo de protección individual consistente en guantes de PVC o nitrilo al manipular el medicamento veterinario. Se recomienda usar un delantal impermeable para proteger la ropa.

Si la ropa se impregna excesivamente con el medicamento, quítesela y lávela antes de volverla a usar.

Deseche los guantes después de su uso y lávese las manos con agua y jabón. Lavar inmediatamente las salpicaduras de la piel con agua y jabón. En caso de irritación, consulte con un médico.

En caso de tratar a más de un animal a la vez: es especialmente importante una buena ventilación cuando vaya a tratarse a varios animales a la vez. Administrar el medicamento veterinario al aire libre, o reducir la acumulación de vapores sacando a los animales de la sala de tratamiento mientras el alcohol se evapora, y asegurar que la sala de tratamiento se ventila bien entre tratamientos individuales. Asegurar, además, que la sala de secado tiene una buena ventilación, y evitar alojar a varios animales recién tratados en la misma estancia.

Precauciones especiales para la protección del medio ambiente:

No permitir que los perros naden en cursos de agua durante los 2 días posteriores a la aplicación, ya que el fipronilo puede afectar negativamente a los organismos acuáticos.

Gestación:

No debe utilizarse en perras ni gatas gestantes.

Lactancia:

Perros: el spray es seguro en perras en lactación.

Gatos: no debe utilizarse en gatas en lactación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No usar en combinación con otros productos antipulgas que se apliquen directamente sobre el animal.

Sobredosificación:

El riesgo de sufrir efectos adversos puede incrementarse en caso de sobredosis, por lo que los animales deben tratarse siempre con la dosis correspondiente a su peso corporal.

En caso de sobredosificación, acudir a un veterinario, quien iniciará tratamiento sintomático adecuado.

Incompatibilidades principales:

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

7. Acontecimientos adversos

Gatos y perros:

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):

Reacción cutánea¹ (enrojecimiento de la piel¹, prurito¹, alopecia¹)

Hipersalivación²; Vómitos

Hiperestesia³, Depresión del sistema nervioso central³, Signos neurológicos³

Signos respiratorios

¹ Transitoria.

² Si el animal se lame, puede observarse salivación excesiva debido, principalmente, a la naturaleza del excipiente.

³ Reversibles.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización o a su representante local utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde

o

NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Vía de administración: uso cutáneo.

Posología: es importante que el pelaje se humedezca hasta la piel. Dependiendo de la longitud del pelo, aplicar de 3 a 6 ml por kg de peso corporal (es decir, 7,5 a 15 mg de principio activo por kg de peso corporal), lo que equivale a 6 a 12 descargas por kg de peso corporal del formato de 100 ml.

Perros y gatos de pelo corto	3 ml (6 descargas) por kg de peso corporal
Perros y gatos de pelo largo	6 ml (12 descargas) por kg de peso corporal
1 descarga = 0,5 ml	

El frasco de 100 ml contiene:

- de 3 a 6 tratamientos, aproximadamente, para un perro con un peso de 5 kg, dependiendo de la longitud del pelo;
- 8 tratamientos, aproximadamente, para un gato de pelo corto con un peso de 4 kg;
- 2 tratamientos, aproximadamente, para un perro de pelo largo con un peso de 8 kg.

No superar la dosis recomendada.

Método de administración:

Rociar todo el cuerpo del animal, a una distancia aproximada de 10-20 cm.

Administrar en dirección contraria al nacimiento del pelo, asegurándose de que todo el pelaje se humedece por completo. Masajear el pelaje, especialmente en animales de pelo largo, para que el medicamento veterinario penetre hasta la piel.

Para el tratamiento de la zona de la cabeza, y cuando se trate a mascotas jóvenes o nerviosas, pulverizar el medicamento sobre una mano enguantada y frotarlo en el pelaje. Dejar secar de manera natural. No secar con toalla.

Propiedades: la formulación contiene un agente de recubrimiento. Por tanto, tras la pulverización se forma una película que hace que el pelaje brille.

En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre tratamientos es de 4 semanas.

9. Instrucciones para una correcta administración

10. Tiempos de espera

No procede.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25 °C.
Altamente inflamable.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en el frasco. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Periodo de validez después de abierto el frasco: 1 año.

Debe anotarse la fecha de eliminación (1 año tras la apertura) en el espacio destinado a ello en la etiqueta. Descartar cualquier cantidad sobrante de medicamento tras dicha fecha.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que el fipronilo podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

3589 ESP

Un frasco de 100 ml de HDPE, equipado con una bomba pulverizadora capaz de suministrar 0,5 ml por descarga (el tubo de inmersión es de LDPE).

15. Fecha de la última revisión del prospecto

03/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la [Base de Datos de Medicamentos de la Unión](https://medicines.health.europa.eu/veterinary) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX, Raalte
Países Bajos
Tel.: +31 (0) 572 348 834

Fabricante responsable de la liberación del lote:

Beaphar B.V.
Oude Linderteseweg 9

8102 EV, Raalte
Países Bajos

Representantes locales y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Beaphar Ibérica S.L.

C/ Avda. Josep Tarradellas, 123 Planta 9

08029, Barcelona

España

Tel: 699969707

atencionalcliente@es.beaphar.com

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

17. Información adicional