

## PROSPECTO

### 1. Denominación del medicamento veterinario

DYNACAN 50 mg/60mg SOLUCIÓN SPOT-ON GATOS Y HURONES

### 2. Composición

Cada pipeta de 0,5 ml contiene:

#### Principios activos:

Fipronilo 50,00 mg  
(S)-metopreno 60,00 mg

#### Excipientes:

| Composición cualitativa de los excipientes y otros componentes | Composición cuantitativa, si dicha información es esencial para una correcta administración del medicamento veterinario |
|--|---|
| Butilhidroxianisol (E320)                                      | 0,10 mg   |
| Butilhidroxitolueno (E321)                                     | 0,05 mg   |
| Etanol al 96 por ciento  |   |
| Polisorbato 80 (E433)  |   |
| Povidona   |   |
| Dietilenglicol monoetil éter                                   |   |

Solución transparente incolora a ligeramente amarilla.

### 3. Especies de destino

Gatos y hurones

### 4. Indicaciones de uso

#### En gatos:

Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores.

- Eliminación de pulgas (*Ctenocephalides* spp.). La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante 4 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) originadas de huevos puestos por pulgas adultas, durante seis semanas después de la aplicación.
- Eliminación de garrapatas (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus sanguineus*). El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida que persiste hasta 2 semanas frente a garrapatas (basado en datos experimentales).
- Eliminación de piojos picadores (*Felicola subrostratus*).

El medicamento veterinario puede usarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP).

#### En hurones:

- Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas.
- Eliminación de pulgas (*Ctenocephalides spp.*). La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante 4 semanas.
- Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida) originadas de huevos puestos por pulgas adultas, durante cuatro semanas después de la aplicación.
- Eliminación de garrapatas (*Ixodes ricinus*). El medicamento veterinario tiene una eficacia acaricida que persiste durante 4 semanas frente a garrapatas (basado en datos experimentales).

## **5. Contraindicaciones**

En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe usarse en gatitos de menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 1 kg.

El medicamento veterinario no debe usarse en hurones de menos de 6 meses de edad.

No usar en animales enfermos (ej. enfermedades sistémicas, fiebre) o convalecientes.

No usar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas al fármaco con incluso muerte. En ausencia de estudios, el uso del medicamento veterinario no está recomendado en especies distintas a las de destino.

## **6. Advertencias especiales**

### Advertencias especiales:

Cuando se use como parte de la estrategia para el tratamiento de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, se recomiendan aplicaciones mensuales en el animal alérgico. También debe administrarse un tratamiento adecuado a otros perros y gatos que vivan en la misma casa.

### Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Es importante asegurar que el medicamento veterinario se aplica sobre la piel seca, en un área donde el animal no pueda lamerlo, y asegurarse de que los animales no se laman entre sí después del tratamiento.

No se dispone de información sobre el efecto del baño o lavado con champú sobre la eficacia del medicamento veterinario en gatos y hurones. No obstante, en base a la información disponible en perros bañados con champú a partir de 2 días después de la aplicación del medicamento veterinario, no está recomendado bañar a los animales en los dos días siguientes a la aplicación del medicamento veterinario.

Puede haber adhesión de garrapatas aisladas. Por esta razón, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfavorables.

Para un control óptimo de la infestación por pulgas y piojos en una casa con varios animales, todos los gatos y perros deben ser tratados simultáneamente con un medicamento veterinario adecuado.

Las pulgas de las mascotas a menudo infestan la cesta, el lecho y las áreas de descanso de los animales, tales como alfombras y mobiliario blando, que deberían ser tratados, en caso de infestación masiva y al inicio de las medidas de control, con un insecticida adecuado y limpiando con aspiradora regularmente.

No aplique el medicamento veterinario sobre heridas o piel lesionada.

Evite el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental con los ojos, aclare inmediatamente con abundante agua.

#### Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Este medicamento veterinario puede causar irritación ocular, de la piel y de las membranas mucosas. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del medicamento veterinario con la boca, la piel y los ojos.

Los animales o las personas con hipersensibilidad conocida a los insecticidas o al alcohol, deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Evitar que el contenido entre en contacto con los dedos. Si esto ocurre, lavarse las manos con agua y jabón.

En caso de exposición ocular accidental, aclarar los ojos cuidadosamente con agua limpia. Si la irritación ocular persiste, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto o la etiqueta.

Lavarse las manos con agua y jabón después de la aplicación del medicamento veterinario.

Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto de aplicación estuviera seco, y no se debería permitir a los niños jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación estuviera seco. Por lo tanto, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se traten al atardecer, y que estos animales recién tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños.

No fumar, beber o comer durante la aplicación.

Los animales o las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo o a los excipientes, deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

#### Gestación y lactancia:

El medicamento veterinario puede utilizarse durante la gestación en gatos. La toxicidad potencial del medicamento veterinario en gatitos de menos de 8 semanas de edad que estén en contacto con una gata tratada no está documentada. En este caso debe tenerse especial cuidado.

Los estudios de laboratorio efectuados en gatos no han demostrado efectos teratogénicos, tóxicos para el feto o tóxicos para la madre. Utilícese únicamente en hurones gestantes de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

#### Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

#### Sobredosificación:

No se han observado acontecimientos adversos en estudios de seguridad en las especies de destino, realizados en gatos y gatitos de 8 semanas de edad y mayores y de peso, aproximadamente, 1 kg, tratados una vez al mes a cinco veces la dosis recomendada durante 6 meses consecutivos. El riesgo de experimentar acontecimientos adversos (ver sección 7. Acontecimientos adversos) puede aún así incrementarse cuando se sobredosifica. Puede producirse prurito después de la aplicación.

No se han observado acontecimientos adversos en hurones de 6 meses de edad y mayores, en estudios de seguridad, tratados una vez cada 2 semanas durante cuatro tratamientos, a cinco veces la dosis recomendada.

#### Incompatibilidades principales:

No procede.

## 7. Acontecimientos adversos

Gatos y hurones:

|  |  |
|--|--|
| Muy raros<br>(<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados): | <ul style="list-style-type: none"><li>- Hematoma en el lugar de aplicación (equimosis), caída del pelo en el lugar de aplicación, prurito en el lugar de aplicación, eritema en el lugar de aplicación<sup>1</sup>.</li><li>- Prurito generalizado, caída generalizada del pelo.</li><li>- Hipersalivación<sup>2</sup>, vómitos.</li><li>- Trastornos del sistema nervioso (por ejemplo, hiperestesia, depresión).</li></ul> |
|--|--|

1. Las reacciones en el lugar de aplicación son transitorias.
2. Si se produce lamido, puede observarse un breve período de salivación excesiva debido, principalmente, a la naturaleza del vehículo.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde

[https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario\\_tarjeta\\_verde.doc](https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc)

o

NOTIFICAVET <https://sinaem.aemps.es/FVVET/notificavet/Pages/CCAA.aspx>

## 8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Unción dorsal puntual (spot-on).

Gatos:

Una pipeta de 0,5 ml por gato, correspondiente a la dosis mínima recomendada de 5 mg/kg de fipronilo y 6 mg/kg de (S)-metopreno.

Se recomienda una aplicación mensual cuando existe un alto riesgo de reinfestación, y/o si el gato es alérgico a las picaduras de pulgas.

En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas.

Hurones:

Una pipeta de 0,5 ml por hurón.

El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 2 semanas.

## 9. Instrucciones para una correcta administración

Sostener la pipeta en posición vertical. Golpear la parte estrecha de la pipeta para asegurarse de que el contenido permanece en el interior del cuerpo principal de la pipeta. Desprender la punta. Separar el pelo del animal por la base del cuello frente a las escápulas hasta que la piel sea visible. Situar la punta de la pipeta en la piel y apretar la pipeta varias veces hasta vaciar su contenido completamente, directamente sobre la piel en un único punto.

Al aplicar el medicamento veterinario sobre la piel, evitar humedecer en exceso el pelaje, ya que la zona tratada puede quedarse húmeda o con grasa después de la aplicación. Si se produjera este efecto, desaparecerá en las 24 horas posteriores a la aplicación.

#### **10. Tiempos de espera**

No procede.

#### **11. Precauciones especiales de conservación**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Conservar en el envase original.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

#### **12. Precauciones especiales para la eliminación**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Este medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua, puesto que el fipronilo y el (s)-metopreno podrían resultar peligrosos para los peces y otros organismos acuáticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

#### **13. Clasificación de los medicamentos veterinarios**

Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

#### **14. Números de autorización de comercialización y formatos**

3857 ESP

Formatos:

Caja con 1 blíster de 1 pipeta de 0,5 ml  
Caja con 1 blíster de 2 pipetas de 0,5 ml  
Caja con 1 blíster de 3 pipetas de 0,5 ml  
Caja con 2 blísteres de 2 pipetas de 0,5 ml  
Caja con 2 blísteres de 3 pipetas de 0,5 ml

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

#### **15. Fecha de la última revisión del prospecto**

05/2024

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

#### **16. Datos de contacto**

Titular de la autorización de comercialización, fabricante responsable de la liberación del lote y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

LABORATORIOS CALIER, S.A.  
C/ Barcelonès, 26  
Polígono Industrial El Ramassar  
08520 Les Franqueses del Vallès  
Barcelona  
España  
Tel: +34 938 495 133  
E-mail: [pharmacovigilance@calier.es](mailto:pharmacovigilance@calier.es)