PROSPECTO:
AMINODIAN solución inyectable

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:
SUPER'S DIANA, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona) ESPAÑA

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

AMINODIAN solución inyectable

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene:

Sustancias activas:

Lisina (hidrocloruro)	52	mg
Metionina	20	mg
Treonina	10	mg
Leucina	7,5	mg
Valina	6	mg
Isoleucina	4,5	mg

Excipientes:

Alcohol bencílico (E 1519)	10	mg
Otros excipientes, c.s.		

Solución límpida, incolora o de color muy ligeramente amarillo.

4. INDICACIONES DE USO

En todas las especies, tratamiento y prevención de los estados fisiológicos y patológicos que causen deficiencia de las sustancias activas del medicamento.

5. CONTRAINDICACIONES

Administrar con precaución a animales con patologías renales, hepáticas o pancreáticas previas.

6. REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía tarjeta verde
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc

7. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (adultos y terneros)
Ovino (ovejas y corderos)
Caprino (cabras y cabritos)
Caballos (adultos y potros)
Porcino (cerdos y lechones)
Conejos
Perros
Gatos

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular

0,25 ml de medicamento veterinario/kg p.v. (equivalente a 13 mg de lisina (hidrocloruro), 5 mg de metionina, 2,5 mg de treonina, 1,875 mg de leucina, 1,5 mg de valina y 1,125 mg de isoleucina) en dosis única.

En casos que lo requieran, la dosis podrá ajustarse a las necesidades que imponga la situación clínica del animal, siempre bajo control veterinario.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

No superar los 50 ml por punto de inyección.

10. TIEMPOS DE ESPERA

Bovino, ovino y caprino:
- Carne: cero días
- Leche: cero días

Caballos:
- Carne: cero días
- Leche: cero días

Porcino:
- Carne: cero días

Conejos:
- Carne: cero días

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN/

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Período de validez después de abierto el envase: 28 días

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales para cada especie de destino:
No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.
No se ha estudiado su uso en cerdos reproductores y gestantes, utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Precauciones especiales para su uso en animales:
No procede.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:
El alcohol bencílico puede provocar reacciones alérgicas. Las personas con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o al alcohol bencílico deben administrar el medicamento veterinario con precaución.
Usar con precaución para evitar una autoinyección accidental. En caso de autoinyección, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.
Evite el contacto del medicamento veterinario con la piel o los ojos. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese inmediatamente la zona afectada con abundante agua.
Si tras la exposición al medicamento aparecen síntomas tales como erupción cutánea, consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta.
Lávese las manos después de su uso.

Gestación y lactancia:
Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
La lisina presenta antagonismo con la arginina en algunas especies animales.
La metionina interacciona con las vitaminas del grupo B en varias especies animales, potencia la toxicidad del metilmercurio, y puede interferir con la absorción y el efecto de la levodopa.
La absorción de treonina puede verse reducida por la administración de eritromicina.
Se ha descrito antagonismo entre los aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) en varias especies animales, así como una competición entre estos aminoácidos y otros aminoácidos neutros grandes (en particular, triptófano y tirosina) por el transporte de membrana.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):
En caso de sobredosificación, los síntomas que pueden aparecer son reducción de la ingesta, del peso y del crecimiento.

Incompatibilidades:
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

11/2020

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Nº Registro: 3944 ESP

Formatos:
Caja con 1 vial de 100 ml
Caja con 1 vial de 250 ml

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.