

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

AMINODIAN solución inyectable

2. Composición

Cada ml contiene:

Principios activos:

Lisina	52 mg
(equivalente a 65 mg de hidrocloreuro de lisina)	
Metionina	20 mg
Treonina	10 mg
Leucina	7,5 mg
Valina	6 mg
Isoleucina	4,5 mg

Excipientes:

Alcohol bencílico (E 1519).....	10 mg
---------------------------------	-------

Solución límpida, incolora o de color muy ligeramente amarillo.

3. Especies de destino

Bovino (adultos y terneros)
Ovino (ovejas y corderos)
Caprino (cabras y cabritos)
Caballos (adultos y potros)
Porcino (cerdos y lechones)
Conejos
Perros
Gatos

4. Indicaciones de uso

En todas las especies, tratamiento y prevención de los estados fisiológicos y patológicos que causen deficiencia de las sustancias activas del medicamento.

5. Contraindicaciones

Administrar con precaución a animales con patologías renales, hepáticas o pancreáticas previas.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:

No usar en casos de hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

El alcohol bencílico puede provocar reacciones alérgicas.

Las personas con hipersensibilidad conocida a los principios activos o al alcohol bencílico deben administrar el medicamento veterinario con precaución.

Usar con precaución para evitar una autoinyección accidental.

Evite el contacto del medicamento veterinario con la piel o los ojos.

Lávese las manos después de su uso.

En caso de autoinyección, consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese inmediatamente la zona afectada con abundante agua.

Si tras la exposición al medicamento aparecen síntomas tales como erupción cutánea, consulte con un médico y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

Gestación y lactancia:

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

La lisina presenta antagonismo con la arginina en algunas especies animales.

La metionina interacciona con las vitaminas del grupo B en varias especies animales, potencia la toxicidad del metilmercurio, y puede interferir con la absorción y el efecto de la levodopa.

La absorción de treonina puede verse reducida por la administración de eritromicina.

Se ha descrito antagonismo entre los aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) en varias especies animales, así como una competición entre estos aminoácidos y otros aminoácidos neutros grandes (en particular, triptófano y tirosina) por el transporte de membrana.

Sobredosificación:

En caso de sobredosificación, los síntomas que pueden aparecer son reducción de la ingesta, del peso y del crecimiento.

Restricciones y condiciones especiales de uso:

Medicamento administrado bajo el control o supervisión del veterinario.

Incompatibilidades principales:

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

7. Acontecimientos adversos

Ninguno conocido.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con

su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización, utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde: http://bit.ly/tarjeta_verde

o

NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Vía intramuscular

0,25 ml del medicamento veterinario/kg p.v. (equivalente a 13 mg de lisina (hidrocloruro), 5 mg de metionina, 2,5 mg de treonina, 1,875 mg de leucina, 1,5 mg de valina y 1,125 mg de isoleucina) en dosis única.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta.

En casos que lo requieran, la dosis podrá ajustarse a las necesidades que imponga la situación clínica del animal, siempre bajo control veterinario.

9. Instrucciones para una correcta administración

No superar los 50 ml por punto de inyección.

10. Tiempos de espera

Bovino, ovino y caprino:

- Carne: Cero días.
- Leche: Cero días.

Caballos:

- Carne: Cero días.
- Leche: Cero días.

Porcino:

- Carne: Cero días.

Conejos:

- Carne: Cero días.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar el vial en el embalaje exterior, con objeto de protegerlo de la luz.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

14. Números de autorización de comercialización y formatos

Nº Registro: 3944 ESP

Formatos:

Caja con 1 vial de 100 ml

Caja con 1 vial de 250 ml

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

04/2026

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la Base de Datos de Medicamentos de la Unión. (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>)

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización, fabricante responsable de la liberación del lote y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

SUPER'S DIANA, S.L.

Ctra. C-17, km 17

08150 Parets del Vallès (Barcelona) ESPAÑA

+34 93 843 75 36