

## PROSPECTO

### 1. Denominación del medicamento veterinario

Syncroprost 250 microgramos/ml solución inyectable.

### 2. Composición

Cada ml contiene:

**Principio activo:**

Cloprostenol 250 microgramos (equivalente a 263 microgramos de cloprostenol sódico).

**Excipientes:**

Alcohol bencílico (E1519) 20 mg

Solución transparente, incolora.

Prácticamente sin partículas visibles.

### 3. Especies de destino

Bovino (vacas y novillas), caballos (yeguas), porcino (cerdas adultas y nulíparas) y caprino (cabras)



### 4. Indicaciones de uso

Bovino (vacas y novillas)

- Inducción y sincronización del celo en vacas y novillas con cuerpo lúteo funcional.
- Inducción del celo como ayuda para la gestión del subestro (“celo silente”).
- Tratamiento de la endometritis clínica y subclínica en presencia de cuerpo lúteo funcional.
- Tratamiento de quistes lúteos ováricos.
- Inducción del aborto hasta el día 150 de gestación
- Inducción del parto después del día 270 de gestación.

Caballos (yeguas)

- Inducción y sincronización del celo en yeguas con cuerpo lúteo funcional.
- Interrupción temprana de la gestación entre el día 5 y el día 120 de gestación.

Porcino (cerdas y nulíparas)

- Inducción del parto uno o dos días antes de la fecha estimada del parto.

Caprino (cabras)

- Inducción y sincronización del celo en cabras con cuerpo lúteo funcional durante la estación reproductiva.

### 5. Contraindicaciones

No usar en animales gestantes en los que no se pretenda la inducción del aborto o el parto.

No administrar para inducir el parto en animales con sospecha de distocia debida a obstrucción mecánica o posición, presentación y/o postura anormales del feto.

No usar en animales con la función cardiovascular comprometida, broncoespasmo o dismotilidad gastrointestinal.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

## **6. Advertencias especiales**

### Advertencias especiales:

Hay un periodo refractario de varios días tras la ovulación (por ejemplo, de cuatro a cinco días en bovino y caballos) en el que las hembras son insensibles al efecto luteolítico de las prostaglandinas.

Para la finalización de la gestación en bovino, los mejores resultados se obtienen antes del día 100 de gestación. Los resultados son menos fiables entre los días 100 y 150 de gestación.

La respuesta de las cerdas adultas y nulíparas a la inducción del parto puede verse influida por el estado fisiológico y el tiempo de tratamiento. La gran mayoría de los animales, el 95 %, comenzarán a parir dentro de las 36 horas posteriores al tratamiento. Puede esperarse que la mayoría de los animales respondan en las 24 +/- 5 horas siguientes a la inyección, excepto en aquellos casos en los que el parto espontáneo sea inminente.

### Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

Para reducir el riesgo de infecciones anaerobias derivadas de la vasoconstricción en el punto de inyección, se deben evitar las inyecciones en zonas de la piel contaminadas (húmedas o sucias). Limpiar y desinfectar completamente los puntos de inyección antes de la administración.

No administrar por vía intravenosa.

Todos los animales deben recibir una supervisión adecuada después del tratamiento. La inducción del parto o el aborto puede causar distocia, muerte fetal y/o metritis. La incidencia de retención de placenta puede aumentar dependiendo del momento del tratamiento en relación con la fecha de cubrición.

La inducción prematura del parto reducirá el peso del lechón al nacer y aumentará el número de lechones nacidos muertos y de lechones nacidos inmaduros o no viables. Es esencial que la duración media de la gestación se calcule en cada explotación a partir de los registros anteriores y que no se anticipe el final de la gestación más de dos días.

La inyección en tejido adiposo puede producir una absorción incompleta del medicamento veterinario.

El cloprostenol puede causar efectos relacionados con la actividad de la prostaglandina F2 $\alpha$  en los músculos lisos, como aumento de la frecuencia de la micción y la defecación.

### Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Las prostaglandinas del tipo F2 $\alpha$ , como el cloprostenol, pueden absorberse a través de la piel y causar broncoespasmo o aborto espontáneo.

Se debe tener cuidado al manipular el medicamento veterinario para evitar la autoinyección o el contacto con la piel.

Las mujeres embarazadas, las mujeres en edad fértil, los asmáticos y las personas con otras enfermedades de las vías respiratorias deben evitar el contacto durante la manipulación de este medicamento veterinario. Usar un equipo de protección individual consistente en guantes impermeables al manipular el medicamento veterinario.

Si se produce un derrame accidental sobre la piel, debe lavarse inmediatamente con agua y jabón.

En caso de autoinyección o derrame sobre la piel accidental, consulte con un médico inmediatamente, particularmente si se produce dificultad para respirar, y muéstrela el prospecto o la etiqueta.

Este medicamento veterinario puede provocar reacciones de hipersensibilidad. Las personas con hipersensibilidad conocida al alcohol bencílico deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Lávese las manos después de su uso.

#### Precauciones especiales para la protección del medio ambiente:

No procede.

#### Gestación:

No utilizar en animales gestantes en los que no se pretenda la inducción del aborto o del parto.

#### Lactancia:

El medicamento puede utilizarse durante la lactancia.

#### Fertilidad:

El cloprostenol tiene un amplio margen de seguridad y no afecta negativamente a la fertilidad en bovino. Tampoco se han notificado efectos nocivos en la progenie de una inseminación o cubrición tras el tratamiento con este medicamento veterinario para los productos de la concepción obtenidos después del tratamiento.

#### Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

El uso concomitante de oxitocina y cloprostenol aumenta los efectos sobre el útero.

El uso concomitante de progestágenos disminuye el efecto del cloprostenol.

No administrar el medicamento veterinario junto con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) ya que inhiben la síntesis de prostaglandinas endógenas.

#### Sobredosificación:

Bovino: Con una sobredosis de 5 a 10 veces el efecto secundario más frecuente es el aumento de la temperatura rectal. Sin embargo, esto suele ser transitorio y no perjudicial para el animal. En algunos animales también se puede observar una salivación limitada o diarrea transitoria.

Caballos: Los efectos adversos observados con mayor frecuencia son sudoración y disminución de la temperatura rectal. Sin embargo, suelen ser transitorios y no perjudiciales para el animal. Otras posibles reacciones son aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, molestias abdominales, incoordinación locomotora y postración. Si ocurren, es probable que se observen dentro de los 15 minutos posteriores a la inyección y desaparezcan en 1 hora. Las yeguas suelen seguir comiendo durante el proceso.

Porcino: En general, una sobredosis puede producir los siguientes síntomas: aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, broncoconstricción, aumento de la temperatura corporal, aumento de la cantidad de heces y orina, salivación, náuseas y vómitos. En casos peores puede producirse una diarrea transitoria.

No hay antidotos disponibles, el tratamiento debe ser sintomático, suponiendo que la prostaglandina F<sub>2α</sub> actúa sobre las células del músculo liso.

#### Restricciones y condiciones especiales de uso:

Medicamento administrado bajo el control o supervisión del veterinario.

#### Incompatibilidades principales:

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

## 7. Acontecimientos adversos

### Bovino (vacas y novillas)

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raros<br>(1 a 10 animales por cada 10 000 animales tratados):                            | Infección en el punto de inyección <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muy raros<br>(<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados): | Anafilaxia <sup>2</sup> .<br>Aumento de la frecuencia respiratoria <sup>3</sup> .<br>Aumento de la frecuencia cardíaca <sup>3</sup> .<br>Dolor abdominal <sup>3</sup> , diarrea <sup>3,5</sup> .<br>Incoordinación <sup>3</sup> .<br>Postración <sup>3</sup> .<br>Retención de placenta <sup>4</sup> , metritis <sup>4</sup> , distocia <sup>4</sup> , muerte fetal <sup>4</sup> .<br>Inquietud, micción frecuente <sup>3,5</sup> . |

<sup>1</sup> Puede ocurrir si bacterias anaerobias penetran en el punto de inyección, especialmente tras la inyección intramuscular, y pueden generalizarse. Al primer signo de infección, debe emplearse una terapia antibiótica agresiva, que incluya en particular a las especies clostridiales. Se deben emplear técnicas asépticas cuidadosas para disminuir la posibilidad de estas infecciones.

<sup>2</sup> Requiere atención veterinaria inmediata. Puede ser mortal.

<sup>3</sup> El cloprostenol puede causar efectos similares a la actividad de la prostaglandina F2α en los músculos lisos.

<sup>4</sup> Puede deberse a la inducción del parto o el aborto. Como parte de la inducción del parto, dependiendo de la fecha de tratamiento frente fecha de cubrición, la incidencia de retención de placenta puede aumentar.

<sup>5</sup> En caso de que aparezcan, estos efectos se observan durante los 15 minutos posteriores a la inyección y normalmente desaparecen después de una hora.

### Caprino (cabras):

|                                                                                          |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Raros<br>(1 a 10 animales por cada 10 000 animales tratados):                            | Infección en el punto de inyección <sup>1</sup> . |
| Muy raros<br>(<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados): | Anafilaxia <sup>2</sup> .                         |

<sup>1</sup> Puede ocurrir si bacterias anaerobias penetran en el punto de inyección, especialmente tras la inyección intramuscular, y pueden generalizarse. Al primer signo de infección, debe emplearse una terapia antibiótica agresiva, que incluya en particular a las especies clostridiales. Se deben emplear técnicas asépticas cuidadosas para disminuir la posibilidad de estas infecciones.

<sup>2</sup> Requiere atención veterinaria inmediata. Puede ser mortal.

### Caballos (yeguas):

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poco frecuentes<br>(1 a 10 animales por cada 1 000 animales tratados):                   | Celo anormal <sup>1</sup> .                                                                                                                                                        |
| Raros<br>(1 a 10 animales por cada 10 000 animales tratados):                            | Infección del punto de inyección <sup>2</sup>                                                                                                                                      |
| Muy raros<br>(<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados): | Anafilaxia <sup>3</sup> .<br>Aumento de la frecuencia respiratoria <sup>4</sup> .<br>Aumento de la frecuencia cardíaca <sup>4</sup> .<br>Aumento de la sudoración <sup>4,5</sup> . |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dolor abdominal <sup>4</sup> , cólico <sup>6</sup> , diarrea <sup>4,8</sup> .<br>Incoordinación <sup>4</sup> , temblor muscular <sup>5</sup> .<br>Postración <sup>4</sup> , disminución de la temperatura corporal <sup>4</sup> .<br>Retención de placenta <sup>7</sup> , metritis <sup>7</sup> , distocia <sup>7</sup> , muerte fetal <sup>7</sup> .<br>Inquietud, micción frecuente <sup>4,8</sup> . |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> En la bibliografía se han notificado folículos hemorrágicos (anovulares) y ovulaciones múltiples en yeguas tratadas con cloprostenol.

<sup>2</sup> Puede ocurrir si bacterias anaerobias penetran en el punto de inyección, especialmente tras la inyección intramuscular, y pueden generalizarse. Al primer signo de infección, debe emplearse una terapia antibiótica agresiva, que incluya en particular a las especies clostridiales. Se deben emplear técnicas asépticas cuidadosas para disminuir la posibilidad de estas infecciones.

<sup>3</sup> Requiere atención veterinaria inmediata. Puede ser mortal.

<sup>4</sup> El cloprostenol puede causar efectos similares a la actividad de la prostaglandina F2 $\alpha$  en los músculos lisos.

<sup>5</sup> Parece ser transitorio y se resuelve sin tratamiento.

<sup>6</sup> Leve.

<sup>7</sup> Puede deberse a la finalización de la gestación, dependiendo de la fecha del tratamiento frente a la fecha de cubrición, la incidencia de retención de placenta puede aumentar.

<sup>8</sup> En caso de que aparezcan, estos efectos se observan durante los 15 minutos posteriores a la inyección y normalmente desaparecen después de una hora.

#### Porcino (cerdas adultas y nulíparas)

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raros<br>(1 a 10 animales por cada 10 000 animales tratados):                            | Infección del punto de inyección <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Muy raros<br>(<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados): | Anafilaxia <sup>2</sup> .<br>Aumento de la frecuencia respiratoria <sup>3</sup> .<br>Aumento de la frecuencia cardíaca <sup>3</sup> .<br>Dolor abdominal <sup>3</sup> , diarrea <sup>3,5</sup> .<br>Incoordinación <sup>3</sup> .<br>Postración <sup>3</sup> .<br>Retención de placenta <sup>4</sup> , metritis <sup>4</sup> , distocia <sup>4</sup> , muerte fetal <sup>4</sup> .<br>Inquietud, micción frecuente <sup>3,5</sup> . |

<sup>1</sup> Puede ocurrir si bacterias anaerobias penetran en el punto de inyección, especialmente tras la inyección intramuscular, y pueden generalizarse. Al primer signo de infección, debe emplearse una terapia antibiótica agresiva, que incluya en particular a las especies clostridiales. Se deben emplear técnicas asépticas cuidadosas para disminuir la posibilidad de estas infecciones.

<sup>2</sup> Requiere atención veterinaria inmediata. Puede ser mortal.

<sup>3</sup> El cloprostenol puede causar efectos similares a la actividad de la prostaglandina F2 $\alpha$  en los músculos lisos.

<sup>4</sup> Puede deberse a la inducción del parto. Como parte de la inducción del parto, dependiendo de la fecha de tratamiento frente a la fecha de cubrición, la incidencia de retención de placenta puede aumentar.

<sup>5</sup> En caso de que aparezcan, estos efectos se observan durante los 15 minutos posteriores a la inyección y normalmente desaparecen después de una hora.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización, utilizando los datos de contacto que encontrará el final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde:

[http://bit.ly/tarjeta\\_verde](http://bit.ly/tarjeta_verde)

o

NOTIFICAVET: <https://sinaem.aemps.es/fvvet/NotificaVet/>

## 8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Vía intramuscular.

**Bovino**

Una dosis equivale a 500 microgramos de cloprostenol por animal, correspondientes a 2 ml del medicamento veterinario.

**Inducción y sincronización del celo**

Administrar una dosis por animal. Cuando no se observan síntomas de celo, se puede administrar una segunda dosis al cabo de 11 días.

**Tratamiento de la endometritis clínica y subclínica en presencia de cuerpo lúteo funcional:**

Administrar una dosis por animal. Si es necesario, repetir el tratamiento 10-14 días después. Tratamiento de quistes lúteos ováricos: Administrar una dosis única por animal.

**Tratamiento de quistes lúteos ováricos:**

Administrar una dosis única por animal.

**Inducción del parto:**

Administrar una dosis única por animal, no más pronto de 10 días antes de la fecha prevista del parto.

**Inducción del aborto hasta el día 150 de gestación:**

Administrar una dosis única por animal, entre el día 5 y el día 150 de gestación.

**Caprino (cabras):**

Una dosis equivale a 100-125 microgramos de cloprostenol por animal, que corresponden a 0,4-0,5 ml del medicamento veterinario.

**Inducción del celo:**

Administrar una dosis por animal.

**Sincronización del celo:**

Administrar una segunda dosis por animal 10-12 días después de la primera dosis.

**Caballos (yeguas):****Ponis y caballos de peso inferior a 500 kg:**

Una dosis equivale a 125-250 microgramos de cloprostenol por animal, que corresponden a 0,5-1 ml del medicamento veterinario.

**Caballos de más de 500 kg de peso:**

Una dosis equivale a 250-500 microgramos de cloprostenol por animal, que corresponden a 1-2 ml del medicamento veterinario.

**Inducción y sincronización del celo:**

Administrar una dosis única por animal.

**Interrupción temprana de la gestación entre el día 5 y el día 120:**

Administrar una dosis única por animal, no más pronto de 5 días después de la ovulación.

**Porcino (cerdas adultas y nulíparas)**

Una dosis equivale a 175 microgramos de cloprostenol por animal, que corresponden a 0,7 ml del medicamento veterinario.

**Inducción del parto:**

Administrar una dosis única por animal uno o dos días antes de la fecha estimada de parto (ver también advertencias en sección 3.5).

Administrar por vía intramuscular profunda con una aguja de al menos 4 cm de longitud.

El tapón de goma se puede perforar con seguridad hasta 10 veces. Cuando se traten grupos de animales de una sola vez, utilizar una aguja de extracción que haya sido introducida en el tapón del vial para evitar que el tapón se pinche en exceso. La aguja de extracción se debe retirar después del tratamiento. En caso contrario, se recomienda el uso de una jeringa multidosis.

## **9. Instrucciones para una correcta administración**

### **10. Tiempos de espera**

#### **Bovino**

Carne: 1 día.

Leche: Cero horas.

#### **Cabras, yeguas:**

Carne: 2 días.

Leche: 24 horas.

#### **Porcino**

Carne: 1 día.

### **11. Precauciones especiales de conservación**

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja y en el vial después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

### **12. Precauciones especiales para la eliminación**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

El medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua puesto que el cloprostenol podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

### **13. Clasificación de los medicamentos veterinarios**

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

### **14. Números de autorización de comercialización y formatos**

4079 ESP

Caja de cartón con un vial de 10ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml o 10 viales de 20 ml.  
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

**15. Fecha de la última revisión del prospecto**

07/2025

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Datos de contacto**

Titular de la autorización de comercialización y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Ceva Salud Animal, S.A.  
Avda. Diagonal 609-615  
08028 Barcelona  
España  
[Teléfono: 00 800 35 22 11 51](tel:0080035221151)  
E-mail: [pharmacovigilance@ceva.com](mailto:pharmacovigilance@ceva.com)

Fabricante responsable de la liberación del lote:

Vetem S.p.A.,  
Lungomare Pirandello, 8  
92014 Porto Empedocle (AG)  
Italia