

PROSPECTO

Selaspot 45 mg solución para unción dorsal puntual para gatos 2,6-7,5 kg
Selaspot 60 mg solución para unción dorsal puntual para gatos 7,6-10,0 kg

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:

Bimeda Animal Health Limited
Unit 2/3/4 Airton Close,
Tallaght, Dublín 24,
Irlanda

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Selaspot 45 mg solución para unción dorsal puntual para gatos 2,6-7,5 kg
Selaspot 60 mg solución para unción dorsal puntual para gatos 7,6-10,0 kg

selamectina

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada pipeta contiene:

Principio activo:

Selaspot 45 mg para gatos	60 mg/ml solución	selamectina	45 mg
Selaspot 60 mg para gatos	60 mg/ml solución	selamectina	60 mg

Excipientes:

Butilhidroxitolueno (E321)	0.8 mg/ml
----------------------------	-----------

Solución transparente, de incolora a ligeramente amarilla.

4. INDICACIÓN(ES) DE USO

- **Tratamiento y prevención de las infestaciones de pulgas** causadas por *Ctenocephalides* spp. durante un mes tras una única administración. Esto se debe a las propiedades adulticidas, larvicidas y ovicidas del medicamento veterinario. El medicamento veterinario es ovicida durante 3 semanas después de la administración. Mediante la reducción de la población de pulgas, el tratamiento mensual de las hembras gestantes y en lactación también ayudará a prevenir las infestaciones de pulgas en la camada hasta las siete semanas de edad. El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica a la picadura de las pulgas y, gracias a su acción ovicida y larvicida, puede ayudar a controlar las infestaciones ambientales por pulgas existentes en las zonas a las que el animal tiene acceso.
- **Prevención de dirofilariosis** causada por *Dirofilaria immitis* con administración mensual.

- **Tratamiento de la sarna otodéctica** (*Otodectes cynotis*).
- **Tratamiento de las infestaciones por piojos masticadores** (*Felicola subrostratus*)
- **Tratamiento de ascáridos adultos** (*Toxocara cati*)
- **Tratamiento de los anquilostomas intestinales adultos** (*Ancylostoma tubaeforme*).

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en animales de menos de 6 semanas de edad.

No usar en animales que padezcan enfermedades concomitantes o que estén debilitados y presenten bajo peso (para su tamaño y edad).

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

6. REACCIONES ADVERSAS

El uso de este medicamento veterinario se ha asociado con una leve alopecia temporal en el lugar de aplicación en gatos en raras ocasiones. También puede observarse una irritación focal temporal en muy raras ocasiones. La alopecia y la irritación normalmente se resuelven por sí solas, pero en algunos casos puede ser pertinente un tratamiento sintomático.

La aplicación del medicamento veterinario puede producir un apelmazamiento localizado temporal del pelo en el lugar de aplicación y/o la aparición ocasional de una pequeña cantidad de polvo blanco en raras ocasiones. Esto es normal y generalmente desaparece a las 24 horas de la administración del tratamiento y no afecta ni a la seguridad ni a la eficacia del medicamento veterinario.

Al igual que con otras lactonas macrocíclicas, se han observado signos neurológicos reversibles, incluidas las convulsiones, tras el uso del medicamento veterinario en muy raras ocasiones.

La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:

- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 animales tratados presenta reacciones adversas)
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados)
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1000 animales tratados)
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10 000 animales tratados)
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluyendo casos aislados).

Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía tarjeta verde:

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc

7. ESPECIES DE DESTINO

Gatos (2,6-7,5 kg)

Gatos (7,6-10,0 kg)

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal puntual.

Aplicar sobre la piel de la base del cuello, delante de las escápulas.

El medicamento veterinario debe administrarse por vía tópica en una sola aplicación de una dosis única de un mínimo de 6 mg/kg de selamectina. Cuando deban tratarse infestaciones o infecciones concurrentes en el mismo animal con el medicamento veterinario, solo debe administrarse una aplicación de la dosis recomendada de 6 mg/kg cada vez. A continuación, se especifica la duración apropiada del periodo de tratamiento para cada parásito.

Administrar el medicamento veterinario de acuerdo con la siguiente tabla:

Gatos (kg)	Color de la tapa de la pipeta	mg de selamectina administrada	Potencia (mg/ml)	Volumen administrado (tamaño nominal de la pipeta, en ml)
2,6-7,5	Azul	45	60	0,75
7,6-10,0	Gris pardo	60	60	1,0
> 10		Combinación apropiada de pipetas	60	Combinación apropiada de pipetas

Tratamiento y prevención de pulgas

Animales de más de seis semanas de edad:

Tras la administración del medicamento veterinario al animal, las pulgas adultas y las larvas mueren y no se producen huevos viables. Esto detiene la reproducción de la pulga y puede ayudar en el control de las infestaciones ambientales por pulgas existentes en las zonas a las que el animal tiene acceso.

Para la prevención de las infestaciones por pulgas, el medicamento veterinario debe administrarse al animal a intervalos mensuales durante toda la temporada de pulgas, comenzando un mes antes de que las pulgas se activen. Esto garantiza que las pulgas que infestan al animal mueren, que estas pulgas no producen huevos viables y que las larvas (que se encuentran solo en el ambiente) también mueren. De este modo se rompe el ciclo vital de las pulgas y se evitan las infestaciones.

Para su uso como parte de una estrategia de tratamiento para la dermatitis alérgica a las picaduras de pulgas, el medicamento veterinario debe administrarse a intervalos mensuales.

Tratamiento de animales gestantes y en lactación para prevenir infestaciones por pulgas en gatitos:

Mediante la reducción de la población de pulgas, el tratamiento mensual de las hembras gestantes y en lactación ayudará a prevenir las infestaciones por pulgas en la camada hasta las siete semanas de edad.

Prevención de dirofilariosis

La necesidad de tratamiento debe ser determinada por el veterinario y debe basarse en la situación epidemiológica local (ver sección “Advertencias especiales para cada especie de destino”). Para la prevención de la enfermedad de la dirofilariosis (gusano del corazón), el medicamento veterinario debe administrarse en el plazo de un mes tras la primera exposición del animal a los mosquitos y, posteriormente, mensualmente hasta un mes después de la última exposición a los mosquitos. Si se omite una dosis y se excede el intervalo mensual entre dosis, la administración inmediata del medicamento veterinario y la reanudación de la dosificación mensual minimizarán la posibilidad de desarrollar el gusano del corazón en fase adulta. La necesidad de un tratamiento prolongado debe ser determinada por el veterinario. Cuando se sustituya a otro medicamento veterinario preventivo contra el gusano del corazón en un programa de prevención de la dirofilariosis, la primera dosis del medicamento veterinario deberá administrarse en el plazo de un mes a partir de la última dosis del medicamento anterior.

Tratamiento de infestaciones por ascáridos

Debe administrarse una dosis única del medicamento veterinario.

Tratamiento de las infestaciones por piojos masticadores

Debe administrarse una dosis única del medicamento veterinario.

Tratamiento de la sarna otodéctica


Debe administrarse una dosis única del medicamento veterinario.

Tratamiento de las infestaciones por anquilostomas


Debe administrarse una dosis única del medicamento veterinario.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Retire la pipeta de su embalaje protector.




Sostenga la pipeta en posición vertical, presione firmemente la tapa para perforar el precinto del aplicador y, a continuación, retire la tapa.



Separe el pelo en la base del cuello del animal, por delante de las escápulas, para dejar al descubierto una pequeña zona de piel.



Coloque la punta de la pipeta sobre la piel sin masajear. Apriete firmemente la pipeta para vaciar el contenido en un punto. Evite el contacto del medicamento veterinario con los dedos.



No aplicar cuando el pelo esté mojado. Sin embargo, lavar al animal con champú o mojarlo al cabo de 2 o más horas después del tratamiento no reduce la eficacia del medicamento veterinario.

10. TIEMPO(S) DE ESPERA

No procede.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz. Conservar en lugar seco. No conservar a temperatura superior a 25 °C.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja y en el blíster después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Advertencias especiales para cada especie de destino:

Se puede bañar a los animales 2 horas después del tratamiento, sin que este pierda eficacia.

No aplicar cuando el pelo del animal esté mojado. Sin embargo, lavar al animal con champú o mojarlo al cabo de 2 o más horas después del tratamiento no reduce la eficacia del medicamento veterinario.

Para el tratamiento de la sarna otodéctica, no lo aplique directamente en el canal auditivo.

Es importante aplicar la dosis como se indica para minimizar la cantidad que el animal pueda lamer.

En caso de un lamido significativo, en raras ocasiones puede observarse un breve periodo de hipersalivación en los gatos.

El medicamento veterinario puede administrarse de manera segura a animales infectados con el gusano del corazón en fase adulta, sin embargo, de acuerdo con las buenas prácticas veterinarias, todos los animales de al menos 6 meses de edad y que vivan en países donde exista un vector deben someterse a pruebas para detectar infecciones por el gusano del corazón en fase adulta, antes de iniciar el tratamiento. También se recomienda someter a los animales a análisis periódicos para detectar infecciones por el gusano del corazón en fase adulta, como parte integral de una estrategia de prevención de este parásito, incluso cuando el medicamento veterinario se haya administrado mensualmente. Este medicamento veterinario no es eficaz contra *D. immitis* en fase adulta.

La resistencia de los parásitos a cualquier clase de antihelmíntico puede desarrollarse después del uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de esa clase. Por lo tanto, el uso de este medicamento veterinario debe basarse en la evaluación de cada caso individual y en la información epidemiológica local sobre la sensibilidad actual de las especies de destino, con el fin de limitar la posibilidad de una futura selección de resistencia.

Precauciones especiales para su uso en animales:

Este medicamento veterinario debe aplicarse únicamente sobre la superficie de la piel. No administrar por vía oral ni parenteral.

Mantenga a los animales tratados alejados del fuego y de otras fuentes de ignición durante al menos 30 minutos o hasta que el pelo esté seco.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

El medicamento veterinario es nocivo tras su ingestión. Conserve el medicamento veterinario en el envase original hasta su uso, para evitar que los niños tengan acceso directo al medicamento veterinario. Las pipetas usadas deben desecharse de inmediato y no deben dejarse a la vista ni al alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

El medicamento veterinario irrita la piel y los ojos. Evite el contacto con los ojos, incluido el contacto del ojo con la mano. Lávese las manos después de cada uso y lave inmediatamente con agua y jabón cualquier resto de medicamento veterinario que haya entrado en contacto con la piel. En caso de exposición ocular accidental, enjuague de inmediato los ojos con agua y consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

Evite el contacto directo con animales tratados durante al menos 12 horas tras la aplicación del medicamento veterinario. Por ello, se recomienda aplicar el medicamento veterinario al animal por la noche. No debe permitirse que los animales tratados duerman con sus dueños, especialmente los niños, el día del tratamiento.

No fume, coma ni beba mientras manipula el medicamento veterinario.

Las personas con piel sensible o alergia conocida a medicamentos veterinarios de este tipo deben administrar el medicamento veterinario con precaución.

El medicamento veterinario es altamente inflamable. Manténgalo alejado del calor, chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Puede utilizarse en gatos reproductores, gestantes y en lactación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

No se observaron reacciones adversas tras la administración de 10 veces la dosis recomendada. Se administró selamectina a una dosis 3 veces superior a la recomendada en gatos infestados con el gusano del corazón en fase adulta y no se observaron reacciones adversas. También se administró selamectina a una dosis 3 veces superior a la recomendada en gatos machos y hembras reproductores, incluidas las hembras gestantes y en lactación que amamantan a sus crías, y no se observaron reacciones adversas.

Incompatibilidades:

No procede.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales.

La selamectina puede afectar negativamente a los peces o a determinados organismos acuáticos de los que se alimentan. Los envases y el contenido residual deben eliminarse junto con los residuos domésticos para evitar la contaminación de cualquier curso de agua.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

El medicamento veterinario está disponible en envases de tres y seis pipetas.
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.