PROSPECTO

DRONTAL PLUS SABOR

NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francia

Fabricante que libera el lote:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel – Alemania

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DRONTAL PLUS SABOR

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada comprimido contiene:
Sustancias activas:
Febantel 150 mg
Embonato de Pirantel 144 mg (equivalente a 50 mg de pirantel)
Prazicuantel 50 mg
Excipientes, c.s.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de infestaciones mixtas por nematodos y cestodos de las especies:
Nematodos:
Ascáridos - *Toxocara canis*
- *Toxascaris leonina*
Ancilostomas - *Uncinaria stenocephala*
- *Ancylostoma caninum*
Tricuros - *Trichuris vulpis*
Cestodos: - *Echinococcus granulosus*
- *Echinococcus multilocularis*
- *Dipylidium caninum*
- *Taenia* spp.
- *Multiceps multiceps*
- *Mesocestoides* spp.

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

Tratamiento de las infestaciones causadas por el protozoo *Giardia* spp. en cachorros y perros adultos.

CONTRAINDICACIONES

No usar durante los dos primeros tercios de la gestación ya que no se han realizado suficientes estudios en perras en estas fases de la gestación.
No usar simultáneamente con medicamentos que contengan piperazina.
No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y/o a algún excipiente.

REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones, tras la administración del producto se han observado signos sistémicos como letargia, cambios de comportamiento como agitación e hiperactividad y trastornos gastrointestinales como diarrea y vómitos.
La frecuencia de las reacciones adversas debe entenderse como se indica:
Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10)
Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100)
Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000)
En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000)
En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000, incluyendo casos aislados).
Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.
Posología: La dosis recomendada es de 15 mg de febantel, 14,4 mg de embonato de pirantel y 5 mg de prazicuantel por kg de peso. Esto equivale a 1 comprimido por 10 kg de peso.

Cachorros y perros pequeños	≥ 2 ≤ 5 kg peso	½ comprimido
	> 5 ≤ 10 kg peso	1 comprimido
Perros medianos	>10 ≤ 20 kg peso	2 comprimidos
	>20 ≤ 30 kg peso	3 comprimidos
Perros grandes	>30 ≤ 40 kg peso	4 comprimidos, etc.

En el tratamiento de infestaciones mixtas causadas por nematodos y cestodos: administrar los comprimidos en una sola toma.
El calendario o momento del tratamiento debe basarse en factores epidemiológicos y ser personalizado para cada animal. El programa de tratamiento debe establecerlo el veterinario. Como norma general, en infestaciones por vermes debidamente diagnosticadas, debe realizarse siempre una desparasitación inmediata con repetición de tratamiento en caso necesario.

Si se detecta infestación por *Echinococcus* (*E. granulosus*) en perros, se recomienda la repetición del tratamiento por seguridad.
En el tratamiento de infestaciones causadas por *Giardia* spp.: administrar la dosis recomendada durante 3 días consecutivos.
Se recomienda limpiar a fondo y desinfectar el entorno del animal para prevenir reinfestaciones, en especial cuando los perros se encuentren en perreras o criaderos.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Administrar los comprimidos por vía oral directamente al perro o mezclados con el alimento. No es necesario que ayune antes del tratamiento ni después.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.
No usar después de la fecha de caducidad que figura en la caja.
No conservar comprimidos fraccionados

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Las pulgas actúan como huésped intermedio para un tipo común de tenia: *Dipylidium caninum*. La infestación por tenias se repetirá con toda seguridad a menos que se efectúe control de huéspedes intermedios (pulgas, ratones, etc.).
La infestación por tenias es poco probable en cachorros de menos de 6 semanas de edad. La resistencia del parásito a alguna clase particular de antihelmíntico puede desarrollarse utilizando un antihelmíntico de esa clase de forma frecuente y repetida.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales
En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.
Lavarse las manos después de administrar el medicamento a los animales.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
No usar simultáneamente con piperazina ya que puede antagonizar la eficacia del pirantel.
El uso simultáneo de pirantel junto con compuestos colinérgicos como el levamisol puede provocar toxicidad.
Uso durante la gestación y la lactancia
Ver Contraindicaciones.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario
La administración de 10 veces la dosis recomendada del medicamento fue tolerada sin signos de lesiones en perros y cachorros. Ocasionalmente puede dar lugar a vómitos.
Incompatibilidades
No se han descrito.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

12/2020

INFORMACIÓN ADICIONAL

Formatos:
Formato de 2 comprimidos: Caja con 1 blíster con 2 comprimidos.
Formato de 6 comprimidos: Caja con 3 blísteres con 2 comprimidos.
Formato de 24 comprimidos: Caja con 3 blísteres con 8 comprimidos.
Formato de 56 comprimidos: Caja con 7 blísteres con 8 comprimidos.
Formato de 104 comprimidos: Caja con 13 blísteres con 8 comprimidos.
Formato de 312 comprimidos: Caja con 39 blísteres con 8 comprimidos.
Formato de 1000 comprimidos: Caja con 125 blísteres con 8 comprimidos.
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Nº de registro: 539 ESP

MINISTERIO
DE SANIDAD
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

F-DMV-01-12